



A retenir cette semaine :

Grâce à une météo favorable, les foins vont pouvoir se poursuivre sur la majorité du département. Les troisièmes coupes sont à récolter pour les parcelles réalisées en fauche précoce début-mi avril ! La destination des parcelles avec beaucoup de refus doivent être modifiées : broyage, récolte en foin d'ici 3 semaines ou valorisées en stocks sur pied par des animaux à faible besoin (génisses pleines, bœufs...) dans l'été



Fertilisation :

A cette époque de l'année, la fertilisation est inappropriée : en effet, la minéralisation des réserves du sol suffit à la fourniture des besoins pour la pousse de l'herbe ! La pluviométrie et les fortes chaleurs sont les éléments limitants



Localisation	Hauteur (cm)	Croissance kg MS/ha/j	Observations
St Héand, 575 m	9,0	34,9	10jr avance permis avec 8 kgMS herbe/VL/j, après ralentissement rythme de pâturage.
Périgneux, 680 m	10,2	26,6	5 ^{ème} cycle. Jours d'avance : 17 j, 2 ^{nde} fauche des refus et Pâturage de nuit conseillé
Essertines-en-Chatelneuf, 800 m	9	18,4	5 ^{ème} cycle. Jours d'avance : 15j, 12kgMS herbe pâturée/VL/j.
St Bonnet le Courreau, 1070 m	8,4	21,6	4 ^{ème} cycle 21j avance après fauche des refus , 8-10 kg MS herbe pâturée/VL/j max.
Champoly, 660 m	6,9	22,4	4 ^{ème} cycle 12j avance à 12 kg MS herbe pâturée/VL/j. Insertion paddocks fauchés.
Vézelin, 450m	7,7	19,2	5 ^{ème} cycle : 12j avance, 5 à 8 kg MS herbe pâturée/VL/j. Insertion de prairies fauchées.
St Genest- Malifaux, 950 m	8,2	20,5	5 ^{ème} cycle. Jours d'avance : 15j 100% pâturage. Début repos estival partiel + affouragement conseillés.
Vivans, 320 m	8,7	40,9	4 ^{ème} cycle. Jours d'avance : 20j, 10-12 kgMS herbe pâturée/VL/j. Bientôt des stocks sur pied lactogènes.
Lycée de Chervé	7,6	28,2	4 ^{ème} cycle. Jours d'avance actuels : 10j, 100% herbe pâturée. Affouragement prochain ou nouveaux paddocks
St Marcel de Félines, 490 m	8,4	41 kg	3 ^{ème} tour, topping sur certains paddocks pour limiter le tri
Sauvain, 980 m	7,4	37 kg	Gestion des refus après le 3 ^{ème} tour par de la fauche
Violay, 700 m	12,4	50,1 kg	Dernier passage des VL sur certains paddocks de PN
Violay, 720 m	10,5	68,1 kg	Pâturage des 3 ^{ème} coupes de PT et 6 ^{ème} tour derrière topping
Violay, 850 m	11,3	59,2	Retour en 3 ^{ème} passage sur les PT ensilées début mai

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluviométrique juin
Chalmazel	1112	44,5
Noirétable	1224	39,6
St Sauveur en Rue	1252	54,4
Violay	1272	56,4

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluviométrique juin
Chazelles sur Lyon	1344	64,8
Fourneaux	1419	56,5
La Valla en Gier	1376	50,5
Panissières	1385	60,6
St Georges en Couzan	1259	44,3

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluviométrique juin
Arthun	1350	25,8
Balbigny	1419	59,5
Perreux	1545	32,1
Nandax	1442	30,2
Pélussin	1525	51,3
Savigneux	1366	52,9
Veauchette	1406	45,8

Source infoclimat / météo France au 14/06/2025

Prairie multi-espèces riche en légumineuses après 5 semaines de repousses (enrubannées fin avril) : très lactogène, distribuée en paddocks serrés de nuit, avec fil avant et arrière, en complément de prairie naturelle en journée... environ 30 l de lait /vl/jr avec maïs épi et concentrés pendant les traites



Dégradé en damier des paddocks de nuit, sortie entre 4,5 et 5 cm suivi d'un ébousage avec pneus pour une meilleure répartition des bouses !



Topping : parcelle fauchée 10 jours avant avec pâturage des animaux sur 3 repas... On ne voit plus les traces de l'herbe résiduelle



Pâturage d'une prairie naturelle au deuxième tour à 1000 m d'altitude la semaine dernière : une partie des graminées est épiée, mais la qualité est préservée grâce à une flore très variée