



## A retenir cette semaine :

La croissance restée limitée, et ne permet souvent pas une ration 100 % pâture. Sur les secteurs ayant reçu 15 à 30 mm, la pousse va augmenter avec les températures annoncées



## Sommes de température :

**Mise à l'herbe** : entre 250°C et 300 °C base 1/02

**Semis prairies** : 350 °C base 1<sup>er</sup> février

**Fin du 1<sup>er</sup> tour** : 500 °C = stade épi 5 cm

**Ensilage précoce** : 650 à 700 °C = épi 10 cm

**Récolte début épiaison** : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C



## Réseau suivi croissance d'herbe :

| Localisation                | Hauteur (cm) | Kg MS/ha/Jour | Mise à l'herbe                                                         |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| St Marcel de Félines, 490m  | 7            | 25            | 2 <sup>ème</sup> tour, à 2 UGB/ha, ça pousse moins que la consommation |
| Violay, 700m                | 9,2          | 48,3          | 2 <sup>ème</sup> tour : 20 jours d'avance à 50 %                       |
| Violay, 710m                | 8,6          | 38,1          | 2 <sup>ème</sup> tour, ration 2/3 pâture                               |
| Violay, 850m                | 7,3          | 24,6          | Début 2 <sup>ème</sup> tour                                            |
| St Héand, 700m              | 8,1          | 35            | 2 <sup>ème</sup> tour – ration 50% pâture                              |
| Nandax, 350 m               | 10,2         | 77,1          | Ensilage et foin séché à venir                                         |
| Chirassimont, 600 m         | 10,2         | 54,1          | 6 kg de MS ingéré                                                      |
| Lay, 450 m                  | 7,4          | 41,5          | Jour/nuit au 11/04 avec 10 kg de MS                                    |
| St Bonnet le Courreau, 900m | 7,1          | 33            | Sortie samedi 15/04                                                    |
| St Christo en Jarez, 800m   | 8,6          | 46            | Déprimage – ration 50% pâture                                          |



## Du côté de la technique : semis du maïs

Le maïs est une plante qui doit démarrer rapidement. Pour cela, le sol doit être suffisamment réchauffé afin d'accélérer la germination et la levée : viser 10 à 12 °C. La température se vérifie dans les 5 premiers centimètres du sol, là où les graines seront déposées ! La météo annoncée pour la semaine suivant le semis prévue est aussi à prendre en compte.



| Stations météo    | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Avril |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| Bard              | 449                    | 18                  |
| Noirétable        | 492                    | 36,5                |
| St Sauveur en Rue | 466                    | 50,3                |
| Violay            | 468                    | 48,6                |

| Stations météo       | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Avril |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Chazelles sur Lyon   | 525                    | 24,2                |
| Fourneaux            | 562                    | 37                  |
| La Valla en Gier     | 553                    | 30,1                |
| Panissières          | 548                    | 30,8                |
| St Georges en Couzan | 525                    | 22,8                |

| Stations météo | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Avril |
|----------------|------------------------|---------------------|
| Arthun         | 561                    | 7,8                 |
| Balbigny       | 606                    | 23,2                |
| Nandax         | 596                    | 31,1                |
| Pélussin       | 635                    | 44,8                |
| Savigneux      | 582                    | 7,8                 |
| Veauchette     | 585                    | 16,2                |



## Montagne (> 800m)

Le premier passage de pâture doit se terminer cette semaine avec l'atteinte des 500 °C dans la plupart des secteurs ! Suivant les besoins et le stock d'herbe sur pied, des parcelles de fauche peuvent encore être pâturées ; leur récolte sera décalée dans le printemps



## Coteaux (600-800m)

Le deuxième tour a débuté, mais la croissance restée limitée ne permet souvent pas une ration 100 % pâture ; les vaches restent encore à l'intérieur la nuit en consommant 1/3 ou ½ ration conservée !



## Plaine (400-600mm)

Les 700 °C synonyme de fauche précoce pour les RGI seront atteints entre le 20 et 25 avril : surveiller les lilas qui vont commencer leur floraison  
Les premières coupes pourront se programmer en fonction de la météo à venir

Source infoclimat / météo France au 15/04/2023



120 à 150 kg de MS/ha/ jour de croissance pour ce mélange RG luzerne pâturé le 6-7 mars



Méteil ensilage riche en protéines



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>  
**Contact :** Stéphane LAURENT  
slaurent@loire-conseil-elevage.fr  
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>  
**Contact :** Pierre VERGIAT  
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr  
Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez