



## A retenir cette semaine :

Côté pâture, la sortie jour et nuit pour les laitières doit se mettre en route pour augmenter la part d'herbe consommée ! Côté récolte, les créneaux risquent d'être difficile cette semaine à cause de la météo ; à suivre et réagir au dernier moment



## Sommes de température :

**Lisier** : 6 semaines minimum avant récolte

**Fumier** : 10 semaines avant récolte

**Apport minéral** : dès que la portance est bonne, minimum 5 semaines avant récolte

**Mise à l'herbe** : entre 250°C et 300 °C ; à réaliser en dessous de 800 m d'altitude



Localisation	Hauteur (cm)	Croissance kg MS/ha/j	Observations
St Héand, 575m	9,1	65,4	3 <sup>ème</sup> cycle, 14 jours d'avance avec débrayage de parcelles
Soleymieux, 630m	8,7	38,2	2 <sup>ème</sup> cycle, 16 jours d'avance avec 8 kg de ms ingéré et débrayage
Périgneux, 680m	8,6	40,2	2 <sup>ème</sup> cycle, 13 jours d'avance à 8 kg de ms ingéré
Essertines-en-Chatelneuf, 800m	7	43,8	2 <sup>ème</sup> cycle, 18 jours d'avance avec 5 kg de ms ingère
St Bonnet le Courreau, 1070m	7,1	40	3 <sup>ème</sup> cycle, 10 jours d'avance à 5 kg de ms ingéré
Champoly, 660m	7	26,6	2 <sup>ème</sup> cycle, 15 jours d'avance avec 5 kg de ms ingère
Vivans, 320 m	8,9	40,6	1 <sup>er</sup> cycle, 15 jours d'avance en 100 % pâture
Lycée de Chervé	9,6	95,2	Fin premier tour, avec fermeture paddocks pour gérer l'avance
St Marcel de Félines, 490 m	10,9	66,2	Lot de 22 VA + veaux sur 10 ha ; 25 jours d'avance, sortie 2 paddocks
Lay, 430 m	5,3	35	pâture VL 9h/jr pour 8 kg de ms ingérés
Violay, 700 m	10	72,5	Deuxième tour, pâturage nuit et sortie 4 parcelles pour fauche
Violay, 720 m	10,7	84,7	Deuxième tour en cours, pâture jour et nuit, débrayage 3 paddoks
Violay , 850 m	9,1	65,3	Paddocks en place, fermeture silo herbe
Saint Just en Chevalet, 700 m	10,6	85	Fin du premier tour
Sauvain, 980 m	6,4	44,8	Pâturage depuis 1 semaine

Stations météo	Somme T°C depuis 1 <sup>er</sup> février	Cumul pluviométrique. avril
Chalmazel	449	54,6
Noirétable	550	50,9
St Sauveur en Rue	535	81,7
Violy	552	76,2

Stations météo	Somme T°C depuis 1 <sup>er</sup> février	Cumul pluviométrique. avril
Chazelles sur Lyon	590	54,8
Fourneaux	654	72,9
La Valla en Gier	615	63,7
Panissières	627	89,8
St Georges en Couzan	571	49,5

Stations météo	Somme T°C depuis 1 <sup>er</sup> février	Cumul pluviométrique. avril
Arthun	-	-
Balbigny	669	65,6
Perreux	667	53,6
Nandax	669	56,5
Pélussin	-	-
Savigneux	636	61,7
Veauchette	-	-

Source infoclimat / météo France au 19/04/2025



Par rapport à 2024 et 2023, nous avons encore 10 jours de retard en cumul de températures ! Néanmoins, la végétation précoce de type RGI a accéléré son cycle, suite aux fortes chaleurs de début avril, avec une montée des épis dans les tiges à surveiller !



La gestion des parcelles de pâturage est primordiale en ce début de pic de pousse de l'herbe : ne pas hésiter à sortir des parcelles en récolte et réduire les jours d'avance entre 8 et 12! En fonction du chargement à l'hectare, La pousse de l'herbe est au moins aussi élevée que la consommation



Ci-dessus, repousses de RGI de 7 jours suite à une fauche précoce suivie de précipitations : déjà 7 cm de repousses !

Les premières récoltes de RGI non réalisées sur des parcelles bien exposées sont très sensibles à la verse au cas de précipitations importantes ; le risque de perte de qualité de fourrages est important ; il ne faut pas hésiter à exploiter les petites fenêtres météo de 24-36 h pour les réaliser ( ex: vendredi-samedi 18-19 avril)



Les méteils protéiques sont beaucoup moins avancés en stade que les RGI et peuvent attendre tranquillement pour leur récolte