



## A retenir cette semaine :

Les sommes de températures accumulées cette semaine sont dans la moyenne de la saison avec 62°C ; avec toutefois un écart type important passant de 15-16°C par jour à 5-6 en fin de semaine ! Si le stock d'herbe est important, le pâturage de nuit doit débuter ou être poursuivi, le ressenti des animaux n'est pas celui des humains : ils



craignent beaucoup plus la chaleur que le froid ou l'humidité ! La croissance moyenne est autour de 50-55 kg de ms/ha/jour en pâture, mais plutôt 90-100 kg en prairies de fauche



## Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Croissance (kg ms/ha/jr)	
St Héand, 575m	11,1	49,9	
Soleymieux, 630m	8,6	37,7	
Périgneux, 680m	9,6	33,4	
Essertines-en-Chatelneuf, 800m	8	26,9	
St Bonnet le Courreau, 1070m	9,7	47,3	
Champoly, 660m	9,2	40,8	
Lay, 430 m	-	-	12 kg de ms ingéré en jour + nuit
St Marcel de Félines, 490 m	9,2	62,2	Début 2 <sup>ème</sup> tour
Violay, 700 m	7,3	46,9	Début du deuxième tour
Violay, 720 m	10,1	51	Complémentation adaptée à la météo



## Sommes de température :

**Ensilage RGI très précoce** : à partir de 500 °C

**Ensilage RGI classique** : 700-750 °C ( floraison du lilas en repère)

**Ensilage prairies composées multispèces** : 750 à 900 °C



Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. avril
Bard	617	49
Noirétable	633	77
St Sauveur en Rue	630	83
Violay	630	90

Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. avril
Chazelles sur Lyon	683	61
Fourneaux	735	74
La Valla en Gier	720	66
Panissières	691	73
St Georges en Couzan	665	44

Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. avril
Arthun	728	35
Balbigny	773	65
Nandax	765	69
Pélussin	821	81
Savigneux	734	40
Veauchette	765	51

Source infoclimat / météo France au 20/04/2024

## Refus et prairies pauvres



La valorisation des prairies de faible qualité et/ou des refus des animaux productifs peut se réaliser avec un lot à besoins modérés : génisses pleines, croisées viande ou bœufs. Attention toutefois à bien dimensionner le lot afin de limiter le temps de séjours à 3-4 jours derrière le lot principal, pour éviter de pénaliser la prairie ; cette dernière verra son retour décaler dans le circuit de pâturage



## Plaine et Coteaux (< 750 m)

Avec le courant froid subit actuellement, l'évolution des graminées est ralentie, laissant plus de délais pour une récolte avant épiaison ! Néanmoins, dès le retour de fenêtres météo favorable, la mise en route des chantiers de récolte devra reprendre pour assurer une bonne valeur alimentaire du fourrage pour l'année à venir

## Pâturage des jeunes animaux

Les jeunes animaux sont capables de bien valoriser l'herbe, attention toutefois à la transition en fonction de la météo ! Durant cette période de froid et humidité, il est préférable de reporter leur sortie lorsque le temps sera plus favorable... Pour les animaux déjà sortis, vérifier qu'ils aient accès à un abri : haie, bosquet, bois ou cabane avec éventuellement un point d'accès à un fourrage sec (foin en ratelier)

