



A retenir cette semaine :

La pousse de l'herbe a considérablement ralenti, notamment dans les zones humides et froides
50 kg MS/ha/jour de moyenne sur le département, soit 10 kg de moins que la moyenne 2011-2022.



Sommes de température :

Mise à l'herbe : entre 250°C et 300 °C base 1/02

Semis prairies : 350 °C base 1^{er} février

Fin du 1^{er} tour : 500 °C = stade épi 5 cm

Ensilage précoce : 650 à 700 °C = épi 10 cm

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	9,4	36	Sortie de parcelles pour foin
Violay, 700m	8,8	41	3 ^{ème} tour + lot suiveur pour refus
Violay, 710m	9,4	44	Ensilage et début du 3 ^{ème} tour
Violay, 850m	10,7	94	Pâturage nuit et ensilage
St Héand, 700m	12	46	Pâturage jour et nuit
Nandax, 350 m	13,3	50	½ ration pâture en journée
Chirassimont, 600 m	-	-	Pâturage jour et nuit + 1/3 ration
Lay, 450 m	8	56	Début broyage des refus
St Bonnet le Courreau, 900m	9,4	28	Pâturage jour + 1/3 ration
St Christo en Jarez, 800m	8,3	49	Pâturage jour et nuit



Du côté de la technique : Topping

Quelques petits rappels : une hauteur de fauche de 7 cm afin de faciliter la repousse !

La pratique consiste à faucher l'herbe 12 h avant l'entrée des animaux dans le paddok, mais celle-ci est compliquée en période humide comme nous avons actuellement ! En effet, l'intérêt réside dans le préfanage léger permettant de diminuer l'amertume de l'herbe restée du passage précédent. Il faut donc une météo favorable et sèche afin de réussir cette technique



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Bard	802	46,4
Noirétable	862	70
St Sauveur en Rue	853	75,2
Violay	843	44,2

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Chazelles sur Lyon	928	69,3
Fourneaux	984	58,8
La Valla en Gier	970	82,3
Panissières	958	39,4
St Georges en Couzan	920	54,4

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Arthun	989	38,8
Balbigny	1046	40
Nandax	1029	62,2
Pélussin	1108	53,7
Savigneux	1011	457
Veauchette	1018	49,4



Montagne (> 800m)

Les premières coupes vont pouvoir reconstituer du stock de sécurité. Avec le début du troisième tour, la gestion des refus sur parcelle doit être gérée : le topping est difficile avec la météo, le pâturage contraint au fil entraîne une baisse en lait



Coteaux (600-800m)

Les rendements en herbe sont bons à très bons cette année ; les repousses sont assurées pour agrandir la surface pâturée ou réaliser des regains ! Les refus peuvent être valoriser par un lot suiveur avec des animaux à moindre besoins : bœufs, génisses croisées ou laitières



Plaine (400-600mm)

Les deuxièmes coupes sont à récolter 30 à 35 jours après la première sur des prairies avec Ray-grass ; les épis sont à surveiller afin de garder une bonne valeur
La réintégration dans le circuit de pâturage se fera à partir de 15 jours

Source infoclimat / météo France au 20/05/2023



Mélange RGI – vesce velue



Topping : fauche avant pâturage



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
Contact : Stéphane LAURENT
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>
Contact : Pierre VERGIAT
 Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
 Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez