



A retenir cette semaine :

La pousse de l'herbe a repris sa croissance habituelle 61 kg MS/ha/jour de moyenne sur le département la semaine dernière, soit 10 kg de plus que la moyenne 2011-2022. La météo s'annonce orageuse, limitant la possibilité de récolte en foin



Sommes de température :

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C

Pleine épiaison : 1 000 °C foin précoce

Pleine floraison : 1 200 °C période de foin optimale



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	9,4	43	Récolte en enrubanné parcelles fermées mi avril
Violay, 700m	8,8	45	3 ^{ème} tour + lot suiveur pour refus
Violay, 710m	9,8	58	3 ^{ème} tour, gestion avec fauche refus
Violay, 850m	11,4	74	Fin 2 ^{ème} tour avec herbe avancée
St Héand, 700m	-	-	Pâturage jour et nuit
Chirassimont, 600 m	8,9	92	Pâturage jour et nuit + 1/3 ration
Lay, 450 m	7,3	53	Pâturage jour et nuit
St Bonnet le Courreau, 900m	9,7	67	Pâturage jour + 1/3 ration
St Christo en Jarez, 800m	8,0	59	Pâturage jour et nuit + foin



Du côté de la technique : Topping

Quelques petits rappels : une hauteur de fauche de 7 cm afin de faciliter la repousse ! La pratique consiste à faucher l'herbe 12 h avant l'entrée des animaux dans le paddok, mais celle-ci est compliquée en période humide comme nous avons actuellement ! En effet, l'intérêt réside dans le préfanage léger permettant de diminuer l'amertume de l'herbe restée du passage précédent. Il faut donc une météo favorable et sèche afin de réussir cette technique



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Bard	909	50,8
Noirétable	956	96,2
St Sauveur en Rue	951	91,3
Violay	942	49,6

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Chazelles sur Lyon	1030	62,2
Fourneaux	1085	58,8
La Valla en Gier	1071	126,2
Panissières	1059	40,6
St Georges en Couzan	1018	54,8

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Arthun	1090	39,2
Balbigny	1146	40
Nandax	1130	62,2
Pélussin	1219	64,3
Savigneux	1110	45,7
Veauchette	1119	51



Montagne (> 800m)

Les premières coupes doivent être réalisées ; la gestion des refus de pâturage peut commencer en sortant des parcelles en vue de foins tardifs ou en pratiquant une fauche de nettoyage laissée au sol ou valorisée par des animaux à moindre besoins



Coteaux (600-800m)

Avec 100 °C de cumulés la semaine dernière, la végétation évoluée ; les foins précoces vont pouvoir se réaliser, permettant ainsi de rajouter des parcelles dans le circuit de pâturage à partir du 15 juin



Plaine (400-600mm)

La période de fenaison arrive, il faudra exploiter la fenêtre météo pour rentrer un fourrage de qualité ! Les conditions seront favorable aux repousses en respectant toujours les 7-8 cm de hauteurs de fauche

Source infoclimat / météo France au 27/05/2023



Topping : fauche avant pâturage



Repousse de RGI à récolter 35-40 jours après la première exploitation



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez