



Enfin de l'herbe à valoriser de suite

Les épisodes de froid de ces dernières semaines ont fortement retardé le début d'une véritable saison de pâturage. Le retour de températures douces voire chaudes, combiné à l'avancement en saison, va booster la croissance de vos prairies très rapidement. Les frimas matinaux de ce début de semaine ne devraient pas altérer cette dynamique, observable sur prairies temporaires comme permanentes. Etant donné les températures annoncées, quelque soient vos catégories d'animaux, **il est très fortement conseillé d'entamer au plus tard votre pâturage ces prochains jours** (à nuancer sur certains secteurs Monts du Pilat, Haut Forez). **La priorité est de profiter au maximum de cette herbe appétente et lactogène, même consommée en faible proportion, avant les 1ères épiaisons de graminées** (1ères épiaisons des vulpins de prés dans certaines prairies permanentes, ...). S'imposent 3 précautions ces prochains jours :

- Entamer un pâturage tournant (bovins/ovins allaitants) voire (tournant dynamique en vaches/chèvres laitières) dès les premiers jours de pâturage
- Réduire voire arrêter le déprimage afin de concentrer ses effectifs sur ses surfaces dédiées au pâturage de printemps strict en 2025
- Réfléchir dès à présent aux futures parcelles de pâturage à débrayer ces prochaines semaines



Montbéliardes et Simmental en début de pâturage, 2 à 3 kgMS ingérés/VL/j, sur prairie permanente tardive en après-midi (appétence de votre herbe), Sud Monts du Forez, Gravier A.



Localisation	Hauteur (cm)	Croissance (kg MS/ha/j) cette semaine	Observations
St Héand, 575 m	6,9	21,4	Pâturage vaches laitières pâturage tournant fil avant
Soleymieux, 630 m	6,9	22,1	Début pâturage vaches laitières + débrayage pour fauche
Périgneux, 680 m	6,0	15,3	Consommation 5 kgMS herbe pâturée/VL/j prochainement
Essertines-en-Chatelneuf, 800 m	5,6	14,7	Début de pâturage 2-3 kgMS/VL/j
St Bonnet le Courreau, 1070 m	5,4	23,3	Début de pâturage 2-3 kgMS/VL/j
Champoly, 660 m	6,7	27,0	Début pâturage vaches laitières. Bientôt 5 kgMS herbe pâturée/VL/j
Vivans (prairies permanentes humides), 320 m	5,7	24,9	Début pâturage possible ces prochains jours. Amélioration rapide de la portance.
Lycée de Roanne-Chervé 250 m	6,4	32	Sortie 12 VA + veaux le 31/03 + pâturage tournant des génisses de garde
St Marcel de Félines, 490 m	9,8	42	Sortie 1 ^{er} lot et transition la journée pour un autre lot vaches + veaux
Violay, 700 m	6,8	22,5	Premier tour en cours, avec parcelles à faner en déprimage
Violay, 720 m	7,3	31	Début deuxième tour
Bussières, 650 m	7,5	19,4	Pâturage des parcelles à faner en milieu de premier tour
Sauvain, 980 m	4,6	-	Végétation en cours de démarrage

Rédaction de cette semaine :
Augustin Gravier
conseiller fourrages
et prairies Chambre
d'agriculture de la
Loire

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluvio. mars
Chalmazel	223	49,8
Noirétable	360	51,6
St Sauveur en Rue	329	119,2
Violay	338	45

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluvio. mars
Chazelles sur Lyon	368	38,4
Fourneaux	422	42,5
La Valla en Gier	390	63,9
Panissières	398	40,4
St Georges en Couzan	372	37,9

Stations météo	Somme T°C depuis 1 ^{er} février	Cumul pluvio. mars
Arthun	408	41
Balbigny	450	34,1
Perreux	430	46
Pélussin	452	87,1
Savigneux	426	44,3
Veauchette	429	55,2

Source : infoclimat / météo France au 29/03/2025


Valoriser cette précieuse herbe tant attendue : 3 points d'attention (non exhaustifs)

→ Trier ses parcelles de pâturage strict de printemps (toutes productions).

Le 1^{ère} paddock (ou la 1^{ère} parcelle) de votre circuit de pâturage n'est pas forcément le 1^{er} à pâturer ! Les conditions météo de ces derniers jours ont exacerbé les différences d'offre en herbe pâturable entre parcelles voire entre paddocks (effets compositions prairies, conduite de pâturage 2024, fertilisation et fertilité des sols, exposition, ...). **Il est important de classer dès à présent ces paddocks ou parcelles selon leur offre en herbe. Toutes vos prairies et mêmes paddocks, ne produiront pas au même moment ni sur la même durée avec la même qualité d'herbe (surtout en 2025) !**



Montbéliardes en pâturage tournant dynamique à 3-5 kgMS/VL/j, hauteur entrée : 7,5 cm, hauteur de sortie visée : 5,5 cm, Monts du Lyonnais, Gravier A



Prim Holstein en pâturage tournant dynamique 3 kgMS/VL/j, hauteur entrée : 8,7 cm, hauteur de sortie visée : 5,5 cm, piémonts Monts du Pilat, Gravier A



Génisses Blondes d'Aquitaine en système pâturage tournant assez dynamique. En bovins viande, le pâturage tournant rapide (voire dynamique) est la clef pour optimiser au maximum votre herbe (selon sa croissance et sa qualité alimentaire) tout en sécurisant les performances de vos animaux, dans un contexte d'aléas climatiques. Plaine du Forez, Gravier A.

→ Sécuriser vos jours d'avance au pâturage (surtout bovins, à ajuster en petits ruminants).

En vaches laitières, en zones de montagnes et sur certaines zones de coteaux, le nombre de jours d'avance reste souvent trop juste pour une ingestion d'herbe de plus de 5 kgMS herbe/VL/j (même avec 32-35 ares pâturables/VL dans votre circuit de pâturage entier)

⇒ Pour le moment, **conserver un minimum de 21j d'avance au pâturage**, avec 2 à 3 kgMS/VL/j (en plaines, 21j d'avance avec au moins 5 kgMS/VL/j). Ces repères pourront être ajustés ces prochains jours

En bovins comme ovins allaitants, attention à bien sécuriser l'ingestion de vos animaux (toutes catégories) ! Il est important de **sécuriser un minimum de 28 à 35j d'avance** au pâturage avec une pleine ingestion d'herbe pâturée (surface à ajuster selon catégories d'animaux et si fourrage complémentaire), quitte à débrayer des parcelles de pâturage précocement, selon l'évolution des croissances d'herbe.

→ Démarrer un pâturage tournant dynamique dès le départ !

Quelque soient les catégories d'animaux, **il est fortement conseillé d'éviter de démarrer cette saison par du pâturage continu avant de cloisonner en pâturage tournant (dynamique)**. Plusieurs risques :

- Création de refus dès le 1^{er} tour : la moindre hétérogénéité dans votre prairie formera votre futur refus à faucher !
- Une variation importante de la qualité d'herbe ingérée entre votre pâturage continu (tri) et votre pâturage tournant (dynamique) => faute de régularité, gains de lait ou de GMQ plafonnés voire en chute au pâturage
- Une ingestion d'herbe pâturée de haute valeur non sécurisée et irrégulière : compensable en partie en vaches laitières (plafonnement momentané en productivité laitière et taux), très préjudiciables en bovins/ovins allaitants



Pâturage génisses Charolaises 15 mois en pâturage continu avec fourrage complémentaire : risque de développement précoce de refus si maintien de cette pratique sur cette parcelle ces prochains jours. Plaine de Roanne, Gravier A