Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°8 – semaine 14 – lundi 30 MARS 2020

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 29/03/20

Roanne –336m
Somme de t° : 481**°C** +43 °C

Arthun - 350m
Somme de t° : **°C** +°C

Bard – 810m
Somme de t° : 380**°C** +32°C

Savigneux – 380m
Pousse : 55 kg ms d'herbe /ha/jour

St Bonnet le Chateau – 870m
Somme de t° : 389**°C** +41°C

St Maurice en Gourgois – 600m
Hauteur moyenne : 5.2 cm
Mise à l'herbe quelques heures par jour

Ressins – 330 m
Pousse : 45 kg ms d'herbe /ha/jour

Parigny – 400 m
Pousse : 25 kg ms d'herbe /ha/jour

Violay – 830m
Somme de t° : 387**°C** +38°C

Panissières – 600 m
Pousse : 40 kg ms d'herbe /ha/jour
Pâture = ½ ration journalière

St Etienne Andrézieux – 400m
Somme de t° : **478°C** + 47°C

Veauchette – 360m
Somme de t° : 505**°C** +50 °C

Pélussin – 400m
Somme de t° : 520**°C** +67 °C

Point météo :

- sommes de températures : malgré le rafraichissement de ces derniers jours l'avance se maintient à plus de 15 jours par rapport à la « normale ».
- pluviométrie : le mois de mars aura été très sec avec seulement 20 mm enregistrés à Andrézieux (normale à 37 mm)
- prévision pour les 10 prochains jours : températures fraiches (en dessous des « normales ») ; pas de pluies significatives (de plus de 10mm) de prévue.

Que faire cette semaine :

- Zone de plaine (400-600m) : avec l'atteinte du repère des 500°C, le déprimage doit se terminer cette fin de semaine afin de ne pas pénaliser les rendements en fauche. Les premières récoltes vont pouvoir s'envisager sur des RGI non récoltés cet hiver (500°C prévus autour du 02/04).
- Zone de coteaux (600-800m) : poursuite du déprimage et des semis / sursemis de prairie
- Zone de montagne (> 800m) : le retour de la neige complique la gestion des prairies. Dès qu'il sera possible : apport d'azote pour les fauches tardives, poursuite du déprimage, début de semis / sursemis des prairies…

Zoom technique : le sursemis des prairies

- possible à partir de 350°C,
- intervenir sur une végétation la plus rase possible,
- créer de la terre fine avec le passage d'une herse,
- utiliser des espèces agressives ray-grass et trèfle,
- mettre au régime la prairie : pas d'apport minéraux l'année du sursemis,
- utiliser régulièrement la prairie pour limiter la concurrence de la flore en place

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :
A partir de 350 °C pour des prairies de fauche tardive

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1er février

Semis – Sur semis : 350°C base 0-18° au 1er février

Fin du déprimage et premier tour : 500 °C

Ensilage RGI précoce : 550 °C

Ensilage autres prairies : 700 °C

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

LOIRE CONSEIL ÉLEVAGE

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE