



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°9 – semaine 19 – lundi 7 mai 2018

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 5/5/18

Boën - 430m

Somme de t° : 967° à partir du 1^{er} février

Charlieu - 279m

Somme de t° : 969° à partir du 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1050m

Croissance : 127 kg MS/j/ha (93 kg sur 15j)

Nandax - 330m

Croissance : 56 kg MS/J/ha

St Denis sur Coise - 480m

Croissance : 146 kg MS/j/ha

Bard - 810m

Somme de t° : 803° à partir du 1^{er} février

Grammond - 804m

Somme de t° : 799° à partir du 1^{er} février

St Maurice en Gourgois - 780m

Croissance : 64 kg MS/j/ha la semaine dernière

Doizieux - 650m

Croissance : 110 kg MS/J/ha la semaine dernière

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 955° à partir du 1^{er} février



Reprise de la croissance de l'herbe cette semaine.



La croissance la semaine dernière a été de 107 kg/j/ha. Elle se retrouve au même niveau que début avril. La pluviométrie et les températures des semaines à venir conditionnera le maintien de ce niveau de pousse. La fauche des refus peut s'envisager. S'ils sont importants, ils seront exportés après fauche et séchage en foin ou en enrubbage. Dans le cas contraire, il est possible de faucher à 7 cm quelques jours après la sortie des animaux par beau temps. Après un après-midi de séchage, passer les animaux dans la parcelle. Ils consomment le fourrage ainsi fauché.

Pour profiter pleinement du potentiel de pousse à venir, il est important de ne pas faire descendre trop bas les animaux. Les hauteurs de sorties à respecter sont toujours de 6 cm. En effet, une fois l'épiaison passée, il faut tenter de maximiser le potentiel de croissance en « laissant de la feuille » derrière la sortie des animaux. Si vous avez la possibilité d'agrandir la surface pâturable, c'est le moment : réintroduisez les parcelles en deuxième coupe à proximité des bâtiments. Pour maximiser la croissance l'allongement des temps de repos est aussi obligatoire. Sur prairie fertile, on visera un temps de retour de 25-27j ; sur prairie temporaire avec le risque de remontaison des ray grass et avec la faible appétence des dactyles et fétuques élevés, on restera sur des temps de retour de 18-20j. Sur prairie à feuilles fines, l'épiaison n'est pas encore atteinte, l'allongement des temps de repos n'est pas d'actualité.

Foin : faucher dès que possible les parcelles versées.

Les 1000° de somme de température annonce le début des premiers foins. Dès qu'une fenêtre météo se présentera, envisager la fauche des parcelles où le fourrage est au sol. Attention aux reprises de fermentation sur ces bottes faites précocement.

Des repères biologiques pour positionner les pratiques



Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Amélie Bonthoux 04.77.54.44.98

Loire Conseil Elevage - Sourcieux - 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CARTELOIRE D'AGRICULTURE



AGRICULTURE
PEP
BOVINS LAIT