



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°4 – semaine 13 – lundi 26 mars 2018

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France 24/3/18

Boën - 430m

Somme de t° : 231° à partir du 1^{er} février

Charlieu - 279m

Somme de t° : 235° à partir du 1^{er} février

Nandax - 330m

Pâturage tournant sur 21j

St Bonnet Le Courreau - 1050m

Pas de démarrage de la pousse

St Denis sur Coise - 480m

Pâturage tournant sur 10 paddocks de 2j – 30u N
Hauteur d'herbe : 10 cm – Mise à l'herbe : 22/3

Bard - 810m

Somme de t° : 170° à partir du 1^{er} février
Apports à faire avant 200°

Grammond - 804m

Somme de t° : 155° à partir du 1^{er} février
Apports à faire avant 200°

St Maurice en Gourgois - 780m

Pâturage tournant sur 21j – 17 paddocks

Doizieux - 650m

Pâturage 14ha en 10 paddocks pour 240 chèvres
Hauteur d'herbe : 4 cm – 12t fumier cet hiver

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 237° à partir du 1^{er} février

Pâturage : il est temps de lâcher en plaine

Un repère pour la mise à l'herbe est de lâcher à 250°C de somme de température base 0-18°C au 1^{er} février. Il sera atteint cette semaine. Si vous n'avez pas de station météorologique proche de votre exploitation, la pleine floraison des forthisias (observer un arbuste qui n'est pas protégé par un bâtiment ou autre) a lieu à ce cumul de température. De plus, nous arrivons fin mars cette semaine. Il est impératif de commencer le tour de pâture pour avoir terminé le premier tour avant le 15 avril. Mi-avril, la pousse est toujours soutenue et nous risquons de nous faire dépasser si le premier tour n'est pas terminé à ce moment-là. A la mise à l'herbe, les animaux trient moins : c'est le moment de faire pâturer les parcelles avec des feuilles sénescentes poussées de l'automne dernier (dactyle, féтуque). N'attendez pas. Ce déprimage va favoriser la reprise de la pousse et le tallage. On peut aussi mettre à disposition, si l'accès aux parcelles le permet, des parcelles de ray grass dont les feuilles sont touchées par le gel. Les cumuls de précipitations sont très différents sur la Loire : 121mm depuis le 1^{er} février à Charlieu, 39mm à Boën, 78mm à Andrézieux et 99mm à Grammond. Les prévisions nous annoncent une semaine plus tempérée avec de la pluie. Pour limiter l'impact du pâturage sur les prairies :

- Choisir les parcelles les plus saines.
- Réduire le temps de présence des animaux sur la parcelle. 2 à 3 heures suffisent pour ingérer l'herbe disponible. Ne laisser pas les animaux au froid.
- Préférer un paddock d'un jour à un paddock de 3j. L'impact est moindre comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre.

Cette mise à l'herbe progressive assurera une transition de trois semaines.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.


Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février



Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CAPAIRENNE D'AGRICULTURE



AGRICULTURE
PEP
BOVINS LAIT