



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°10 – semaine 18 – lundi 2 mai 2016

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 677° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 112 mm depuis le 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1000m

Croissance moyenne : 25 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 57 kg/ha/j

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 698° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 147 mm depuis le 1^{er} février

St Maurice en Gourgois - 780m

Croissance moyenne : NC kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 29 kg/ha/j

Charlieu - 279m

Somme de t° : 685° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 211 mm depuis le 1^{er} février

Perreux - 260m

Croissance moyenne : 10 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 19 kg/ha/j

St Médard en Forez - 600m

Croissance moyenne : 76 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 93 kg/ha/j

Grammond - 804m

Somme de t° : 510° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 171 mm depuis le 1^{er} février

Pâturage : les gelées ont limité la pousse.

Après avoir atteint plus de 60kgMS/j/ha, la pousse de cette semaine se limite à 37kgMS/j/ha. La douceur et les pluies prévues la semaine prochaine devraient assurer la reprise de la pousse.

En plaine, le ralentissement de la croissance peut permettre de se remettre à jour dans le planning de pâturage. La pleine épiaison des graminées précoces peut entraîner des zones de refus. Vous avez 2 solutions :

- Si votre parcellaire le permet, sortir des parcelles jusqu'à l'heure pâturées pour la fauche en enrubannage ou en foin et remettre des parcelles ensilées en première coupe.
- Dans le cas contraire, il est faut réaliser une fauche de nettoyage ou un broyage des refus. Il doit rester de 5 à 7cm de partie végétative pour une bonne reprise de la pousse.

En montagne, viser une sortie de parcelle à 5cm pour anticiper la reprise de la pousse des semaines à venir. En cette fin de première semaine de mai, on arrive à 600° de somme de température à 800m d'altitude. Il est temps de programmer l'ensilage des prairies les plus précoces dans les 15 prochains jours.

Labour agricole : Qu'est-ce que c'est ?

Les semis de maïs arrivant, les charrues sont sorties. Pour limiter la dilution de la matière organique et favoriser son utilisation en aérobie, il faut l'enfouir le moins possible : 15cm maxi. A vos mètres.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

Apports azotés :


Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février

Pousse d'herbe sur la Loire de 2011 à 2016



Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage - Sourcieux - 42600 Châlain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE



AGRICULTURE
PEP
POISSONS LAITIERS