



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°13 – semaine 23 – lundi 2 juin 2014



Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février Source Météo France

### Juré - 660m

Station de Neulise  
Somme de t° : 1199 °  
Pousse moyenne : 12 kg/ha/j

### Périgneux - 640m

Station de Saint Bonnet Le Château  
Somme de t° : 1002 °  
Pousse moyenne : 9 kg/ha/j

### Rozier en Donzy - 510m


Station de Feurs  
Somme de t° : 1180 °  
Faible pousse : ouverture des parcelles mesurées

### Grammond - 730m

Station de Grammond  
Somme de t° : 1041 °  
Faible pousse : ouverture des parcelles

### Saint Chamond - 440m

Station de St Chamond  
Somme de t° : 1299 °



### Retour de la pluie cette semaine

Le retour de la pluie sur le département limite les conséquences du déficit hydrique ces jours. Entre 10 et 25 mm sont tombés selon les zones. Sur les 2 derniers sites mesurés, la pousse moyenne est de 9 kg/ha/j. C'est très limité.

La pousse de printemps peut être considérée comme terminée. C'est la pluviométrie et la réserve hydrique des sols de votre exploitation qui permettront une pousse estivale.

En moyenne sur les parcelles des sites, 2,7 T de MS ont été utilisés sur 11 semaines ce printemps. Les animaux ont pu pâturer dans de bonnes conditions et ont bien valorisé l'herbe. Les vaches contrôlées sur le département ont produit 1,3 kg de plus sur mars, avril et mai en 2014 par rapport à 2013.

Au pré, le confort de couchage est maximal et, en cas de boiteries d'origine infectieuses (fourchet et maladie de Mortellaro), la contamination est limitée. Ce sont des facteurs à ne pas négliger.



Réussir son pâturage, c'est surtout limiter ses coûts alimentaires. En pâturant ½ ration, vous pouvez gagner 60€/1000l. Si vous avez livré 1000l par jour sur les 11 semaines de suivi, vous avez pu économiser 4600€.

### Envisager la culture de dérobées pour sécuriser les stocks.

Entre 2 céréales ou méteil, l'implantation d'une dérobée peut être faite. Un maïs très précoce peut être semé avant fin juin. Ce sera un fourrage énergétique qui pourra être proposé aux vaches laitières. Les sorghos fourragers et BMR, semés jusqu'à mi-juillet, seront récoltés en ensilage ou enrubannage. Les valeurs de ces fourrages sont plus faibles et sont adaptées à des génisses ou vaches allaitantes. Moha associé ou non à du trèfle d'Alexandrie, semé avant mi-juillet pourra être récolté en foin.

Votre choix se fera en fonction des stocks présents sur votre exploitation.

D'autres dérobées pourront être mises en place plus tard.



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE  
CONSEIL ÉLEVAGE

