



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°13 – semaine 21 – lundi 23 mai 2016

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 953° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 175 mm depuis le 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1000m

Croissance moyenne : 33 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 61 kg/ha/j

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 978° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 188 mm depuis le 1^{er} février

St Maurice en Gourgois - 780m

Croissance moyenne : 50 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 64 kg/ha/j

Charlieu - 279m

Somme de t° : 964° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 279 mm depuis le 1^{er} février

Perreux - 260m

Croissance moyenne : NC kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 86 kg/ha/j

St Médard en Forez - 600m

Croissance moyenne : 78 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 85 kg/ha/j

Grammond - 804m

Somme de t° : 746° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 215 mm depuis le 1^{er} février

Pâturage : ralentissement de la pousse cette semaine

L'herbe disponible est encore de qualité : temps frais et humidité favorisent les repousses feuillues. N'hésitez pas à faire pâturer les repousses derrière ensilage et à laisser pour faucher certains parcs pâturés depuis le printemps. C'est un moyen d'entretenir les prairies en fauchant à + de 6 cm et en laissant montée à l'épiaison les bons graminées. Cela limite également le développement d'espèces indésirables.

Foins : 900 - 1200° accumulation maximale de la biomasse.

Dans les 15 jours à venir, le rapport qualité/quantité sera maximal dans les parcelles à foin en plaine. Le temps couvert avec des averses du mois de mai ne permet pas d'entrevoir une plage pour réaliser les foins. Espérons que juin nous amène des journées ensoleillées. Pour faire du foin, il faut évaporer de 2 à 5 kg d'eau par kg de matière sèche (MS). Le séchage s'effectue en deux temps :


- Une phase de séchage rapide où l'eau est perdue par les stomates si le fourrage est exposé à la lumière.
- Une phase de séchage lente pendant laquelle l'eau restante est évacuée à travers la cuticule.

Cela signifie que pour profiter au maximum de la dessiccation rapide, il faut laisser le fourrage le plus possible au soleil. Il convient donc de faner le plus rapidement possible derrière la fauche.

Travailler votre foin pour un séchage rapide : fanage réalisé rapidement après la fauche, à renouveler plusieurs fois...

Dans l'attente de LA fenêtre météo.

Des repères biologiques pour positionner les pratiques



Comment réaliser un bon foin ?

- Fourrage « jeune »
- Espèces adaptées (tétraploïde interdit)
- Conditions climatiques (3 à 5 jours de beau temps consécutifs)
- Faucher haut (6-8 cm)
- Fanage énergique le plus tôt possible après la coupe
- Faner plusieurs fois (éviter les « paquets »)
- Andainage quand le foin est craquant
- Pressage en dehors des périodes de fortes chaleurs

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CAMPAGNE D'AGRICULTURE

