



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°14 – semaine 22 – lundi 30 mai 2016

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 1055° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 209 mm depuis le 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1000m

Croissance moyenne : 63 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 48 kg

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 1080° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 217 mm depuis le 1^{er} février

St Maurice en Gourgois - 780m

Croissance moyenne : 38 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 44 kg/ha/j

Charlieu - 279m

Somme de t° : 1068° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 329 mm depuis le 1^{er} février

Perreux - 260m

Croissance moyenne : NC kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : nc kg/ha/j

St Médard en Forez - 600m

Croissance moyenne : 48 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 63 kg/ha/j

Grammond - 804m

Somme de t° : 839° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 235 mm depuis le 1^{er} février

Pâturage : Conditions climatiques favorables à la pousse là où il n'y a pas eu d'incidents climatiques...

Les températures comprises entre 10 et 20°C sont favorable à la pousse d'herbe : les ray grass n'ont plus de croissance à plus de 20°C. Cette année leur est favorable. La croissance se maintient à 50kg/j/ha.

Rappel des conditions de pâturage en sols gorgés d'eau :


Dans le nord du département, les précipitations cumulées de ces derniers jours, associées à des sols argileux, rendent le pâturage compliqué. Rappels pour continuer à pâturer au mieux :

- Eviter de rentrer dans une nouvelle parcelle saturée en eau pour ne pas souiller l'herbe.
- Donner de grandes parcelles pour éviter les fortes pressions
- Varier les zones d'entrée et sortie
- Si la portance est trop limitée, garder les vaches à l'intérieur.

Grêle : que faire ?

Dans le sud du département entre Andrézieux et Usson, la grêle est venue ravager les cultures. L'herbe tendre des parcelles en repousse est pilée. Complémentez en fourrages à l'intérieur et limiter le temps de présence à l'extérieur pour laisser les prairies se refaire. Privilégier les parcelles filtrantes sur sol sableux. Les premières parcelles semées en maïs sont les plus abimées. Le maïs est une plante robuste, elle devrait repartir. Il faudra vérifier la densité dans les semaines à venir : à plus de 70 000 pieds/ha, le rendement est correct. Pour les parcelles en céréales, les orges, céréale la plus précoce, sont les plus touchés. Il est possible de les récolter en céréales immatures si un grand nombre épis sont coupés. Il convient de faire expertiser les parcelles si vous êtes assurés, vérifier les délais d'utilisation pour la consommation par les animaux si vous avez utilisé herbicide et fongicide.

Comparaison de la pousse d'herbe 2014-2016



Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chaligny Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMPAGNE D'AGRICULTURE

