



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°1 – semaine 5 – lundi 1 février 2016

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} janvier Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 194° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 4/2/16

Andrézieux Bouthéon - 400m


Somme de t° : 203° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : dépassée
Apports possibles

Charlieu - 279m

Somme de t° : 198° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 2/2/16

Grammond - 804m

Somme de t° : 170° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 8/2/16



Fourrages de qualité : fertiliser au bon moment pour une valorisation optimale de vos engrais.

L'hiver 2016 a été doux jusqu'à maintenant. Par rapport à la moyenne des 20 dernières années, nous avons aujourd'hui 15 jours d'avance.

La minéralisation du sol a continué jusqu'à maintenant : pas de saturation en eau, pas de gelées répétées. Les apports d'engrais organiques notamment en lisier seront très bien valorisés ces jours d'autant que les conditions d'épandages sont bonnes. Ils pourront participer à une bonne part des besoins azotés des plantes.

Pour les prairies précoces, conduites en ensilage ou en enrubannage, l'apport d'azote doit être réalisé dans les 15 jours qui précèdent le démarrage de végétation. Cela se traduit entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février. Ainsi, l'apport sera utilisé au cours de la croissance des plantes. Un apport trop tardif pénalise le rendement.

Tous vos repères sur l'outil : **Date N°Prairies** d'Arvalis.

Céréales : quels risques pour 2016 ?

La douceur de cet hiver a conduit à un fort développement des céréales. Celles-ci sont plus sensibles au froid dès que l'épi commence à monter dans la gaine : épi 1 cm à partir du plateau de tallage. Le risque fongique est important comme les années précédentes. Douceur et humidité favorisent le développement de maladies. Pour limiter ces risques, la date de semis peut être un peu retardée.

Le développement végétatif des céréales est fort cette année. Le tallage est important. Il n'est pas nécessaire d'envisager un premier apport avant le stade épi 1cm. Par contre, n'hésitez pas à vérifier la propreté des parcelles pour désherber avant d'apporter l'engrais.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :


Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février

Effet de la DATE d'APPORT sur le rendement



Source Arvalis

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

