



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°4 – semaine 12 – lundi 20 mars 2017

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France 18/3/17

Saint Germain Laval - 420m

Pâturage tournant sur 20j en PN – 30u N

Hauteur d'herbe : 7.6 cm

Mise à l'herbe le 18/3

Boën - 430m

Somme de t° : 366° à partir du 1^{er} février

Chalmazel - 990m

Somme de t° : 217° à partir du 1^{er} février

Mise à l'herbe à préparer

Saint Maurice en Gourgis - 780m

Pâturage tournant sur 15 paddocks de 1 ou 2 jours

Hauteur d'herbe : 4.1 cm

Mise à l'herbe prévue cette semaine

Perreux - 279m

Somme de t° : 363° à partir du 1^{er} février

Commelle Vernay - 340m

Pâturage tournant sur 18j (11 paddocks) en PN – 30u N

Hauteur d'herbe : 5.6 cm – croissance : 32 kg MS l/j/ha

Mise à l'herbe le 5/3

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 379° à partir du 1^{er} février

Grammond - 804m

Somme de t° : 314° à partir du 1^{er} février

Saint Paul en Jarez - 410m

Démarrage des suivis de croissance

Comme présenté ci-dessus, 4 exploitations seront le support du suivi de croissance cette année. Elles sont réparties de 340m à 780m d'altitude. Ce seront des repères en terme de pousse d'herbe, de gestion du pâturage et de résultats technico-économique.

Mise à l'herbe : la croissance au rendez-vous

Le pâturage se passe dans de bonnes conditions lorsque la hauteur d'herbe se situe entre 4 et 7 cm. Cela évite le surpâturage et permet un bon déprimage. Lors de ce premier passage, les animaux vont consommer l'herbe restée de l'hiver et les jeunes pousses très appétentes. Pour avoir une hauteur d'herbe homogène et un bon tallage, il faut pâturer relativement ras : viser entre 4 et 5 cm en hauteur de sortie des paddocks sur le premier tour.

Dans le roannais, la croissance est de 32kg de MS/ha/j cette semaine. Si 30ares sont disponibles par VL, le pâturage couvre la moitié de la ration : il est important de réduire les fourrages à l'auge pour favoriser l'ingestion d'herbe. Privilégiez la distribution le soir pour lâcher des vaches qui iront pâturer le matin. Si vous réalisez une transition rapide entre la ration d'hiver et celle de printemps avec une météo froide et humide, vous pouvez ajouter de la magnésie à la ration pour éviter les tétanies d'herbage.

Un épisode pluvieux, attendu, est prévu cette semaine. Il est possible d'avoir des ingestions importantes en limitant le temps d'accès au pâturage pour éviter le piétinement. Les vaches peuvent ingérer 2 à 3kg de MS/h. Pâturage express !

Sommes de températures : comment les utiliser ?

Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février




Figure 1 : effet du temps d'accès journalier au pâturage sur la production laitière, l'ingestion et le comportement alimentaire des vaches laitières (Essai 1 : ▲ et △, 13 et 24 kg MS offerts ; Essai 2 : ● et ○, 5 et 10 kg MS de complément ensilage maïs/soja).

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE

