



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°6 – semaine 14 – lundi 4 avril 2016

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 384° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 60 mm depuis le 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1000m

Hauteur d'herbe moyenne : 3,8 cm

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 396° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 84 mm depuis le 1^{er} février

St Maurice en gourgois - 780m

Croissance moyenne : 26 kg/ha/j
Mise à l'herbe fin mars

Charlieu - 279m

Somme de t° : 388° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 99 mm depuis le 1^{er} février

Perreux - 260m


Croissance moyenne : 20 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 15 kg/ha/j

St Médard en Forez - 600m

Croissance moyenne : 33 kg/ha/j
Sur les 15 derniers jours : 26 kg/ha/j

Grammond - 804m

Somme de t° : 270° à partir du 1^{er} février
Précipitations : 106 mm depuis le 1^{er} février




Pâturage : Démarrage de la croissance cette semaine


Le temps doux et humide annoncé cette semaine devrait continué à être favorable à la pousse. Elle a été de 30kg de MS/ha/j environ jusqu'à 800m d'altitude. Si la pluviométrie est suffisante, nous allons entrer sur la période de pleine pousse. Sur cette phase, il est important de consommer l'ensemble de la pousse pour garantir des repousses de qualité au tour prochain. Il est important de vérifier la cohérence entre les besoins du troupeau et le potentiel de pousse du parcellaire pâturé. Pour un troupeau de 40 vl sans complémentation à l'auge, avec une croissance de 50 kg/j/ha sur la période, la surface pâturée doit être d'environ 13 ha (40vl*16 kg MSI/50kg de croissance). Si une complémentation à l'auge est maintenue à 6 kg de MS, la surface à pâturer devra être d'environ 8 ha (40vl*10kg MSI/50kg de croissance). Le potentiel de croissance sur cette période de pleine pousse est variable suivant la météo mais aussi suivant votre gestion du pâturage, le type de prairie et la fertilisation. Parlez-en avec votre conseiller pour estimer le potentiel sur votre exploitation.

Fertilisation : sur céréales et parcs à foin

Les apports azotés fractionnés se poursuivent sur les céréales à paille de façon à optimiser le rendement et la teneur azotée des grains.



Evolution de la valeur du RGI (600m d'alt.) sur fin mars



Objectif : récolte avant 250 g/kg de CB

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CAMARADE D'AGRICULTURE



AGRICULTURE
PEP
BOYNS LAT