



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°7 – semaine 17 – lundi 27 avril 2015

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février Source Météo France

### St Marcel d'Urfé - 670m

Pousse moy. : 110kg/j/ha (88kg sur 15j)

### Boën - 430m

Somme de t° : 653° à partir du 1<sup>er</sup> février

### Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 626° à partir du 1<sup>er</sup> février

### Roche - 950m

Pousse moyenne : 82 kg/j/ha (67kg sur 15j)  
Pesée 15/4 : 26.8ka/VL, 32.8a/ka, 39.2a/ka

### Périgneux - 640m

### Perreux - 255m

Somme de t° : 637° à partir du 1<sup>er</sup> février

### Panissières - 605m


Pousse moyenne : 85kg/j/ha (79kg sur 15j)  
Pesée 15/4 : 26.8kg/VL, 30.6g/kg, 36.5g/kg  
Ration : E maïs : 15kg, foin 2kg, céréales : 2kg, drêches : 4kg

### Grammond - 804m

Somme de t° : 525° à partir du 1<sup>er</sup> février

### St Chamond - 370m

Pousse moyenne : 81kg/j/ha (52kg sur 15j)



### Forte pousse sur les sols avec de la réserve hydrique.

La pousse de l'herbe s'est accélérée cette semaine pour atteindre 95kg/j/ha. Le peu de précipitations de ce week-end devrait maintenir ce niveau de pousse dans les jours à venir. Le pic de la pousse est tardif et en relation avec les sommes de température. Cette pousse a été plus limitée sur les sols craignant le sec.



Sur l'évolution des valeurs des herbes, on peut noter une augmentation du taux de cellulose qui conduira à une diminution de la valeur énergétique de l'herbe. Sur le mélange suisse, la valeur azotée reste identique. Par contre sur le mélange RGI+TV, on note une baisse de MAT. Cette parcelle a été récoltée la semaine dernière.

### Nutrition : optimiser la gestion d'herbe avec la pâture de nuit.

La gestion de la pousse peut devenir délicate pour certains d'entre vous. Il est important de favoriser la gestion d'herbe de qualité. Pour cela, après les quelques nuits fraîches de ces jours, on peut lâcher la nuit. La distribution à l'aube sera limitée et la gestion d'herbe maximale. Si ce n'est pas envisageable en terme d'organisation, n'hésitez pas à sortir quelques parcelles mal consommées qui seront réservées à la fauche et prévoir de remettre des parcelles après ensilage. Une fauche par an permet de gérer les adventices vivaces.

### Céréales : les 3 dernières feuilles assurent le rendement.

Les orges arrivent à épiaison ces jours en plaine. Après trois années difficiles en terme de développement fongique, il est important de surveiller l'émergence de la septoriose, des rouilles et oïdiums. Si moins d'une plante sur 4 présente des symptômes, le traitement fongique n'est pas obligatoire. L'application doit se faire lorsque la dernière feuille est pointante.



Evolution des valeurs d'herbe

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 [ffargier@loire-conseil-elevage.fr](mailto:ffargier@loire-conseil-elevage.fr)

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

