



Observer pour des fourrages de qualité

Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°8 – semaine 18 – lundi 28 avril 2014

Juré - 660m

Station de Neulise
Somme de t° : 742 °
Pousse moyenne : 58 kg/ha/j

Périgneux - 640m

Station de Saint Bonnet Le Château
Somme de t° : 615 °
Pousse moyenne : 54 kg/ha/j

Rozier en Donzy - 510m


Station de Feurs
Somme de t° : 802 °
Pousse moyenne : 25 kg/ha/j
23.4kg/VL à 38.1 de TB et 34 TP avec
80% de pâture et 2 kg de céréales

Grammond - 730m

Station de Grammond
Somme de t° : 648 °
Pousse moyenne : 60 kg/ha/j

Saint Chamond - 440m

Station de St Chamond
Somme de t° : 813 °



Avec le retour de la pluie, maintien de la pousse.

Le retour de la pluie et les températures plus clémentes de la semaine dernière ont légèrement reboosté la pousse de l'herbe cette semaine. Elle est en moyenne de 50 kg/ha/j. Cela couvre les besoins de 3vl/ha sans complémentation à l'auge.

Évaluez la hauteur de sortie des animaux. A plus de 7cm, les vaches sous-consomment l'herbe. Favorisez l'ingestion d'herbe en limitant l'apport de fourrages le matin et lâchez de bonne heure. Vous pouvez également revenir rapidement sur les parcelles avec du stock sur pied.

A moins de 5 cm, augmentez les apports à l'intérieur.

Les ensilages continuent entre les gouttes.



Les premiers chantiers sur les parcelles en ray-grass se sont passés dans de bonnes conditions. Les 700° seront atteints jusqu'à 800m d'altitude. Il convient de planifier prochainement la fauche de ces parcelles. Les prairies plus tardives à base de dactyle, fétuque et luzerne devraient se garnir ces jours si la pluviométrie se maintient. Elles pourront être récoltées à leur tour.

Les semis de maïs ont démarré.

Les premières levées de maïs en plaine se sont faites rapidement et semblent assez régulières. Si l'humidité est suffisante pour reprendre les labours d'hiver, les semis peuvent continuer ces jours. Pour les parcelles labourées dernièrement, semez le maïs dans la fraîcheur du labour. Plus le lit de semence sera sec, plus il faudra enterrer le grain (4/5cm).

Pour le désherbage en pré-levée, les conditions d'efficacité sont maximisées après un cumul de pluie de 10 mm dans les 10j après application. Ces conditions devraient être réunies cette fin de semaine. Les traitements en post-levée permettent de mieux cibler les adventices présentes dans les parcelles et ainsi de réduire les doses appliquées. Une autre alternative : le désherbage mécanique avec herse étrille et bineuse.

LES DIFFERENTS COUPS DE DENTS SUR LA PLANTE



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE

