



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°9 – semaine 17 – lundi 24 avril 2017

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février Source Météo France 15/4/17

Saint Germain Laval - 420m

Croissance : 14 kg MS/j/ha (47kg/j /ha sur 15j)

Perreux - 279m

Somme de t° : 732° à partir du 1^{er} février

Boën - 430m

Somme de t° : 749° à partir du 1^{er} février

Commelle Vernay - 340m

Croissance : 40 kg MS j/ha (46kg/j /ha sur 15j)

Chalmazel - 990m

Somme de t° : 464° à partir du 1^{er} février

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 729° à partir du 1^{er} février

Saint Maurice en Gourgais - 780m

Croissance : 34 kg MS/j/ha (53kg/j /ha sur 15j)

Grammond - 804m


Somme de t° : 637° à partir du 1^{er} février

Froid et manque d'eau réduisent fortement la pousse de l'herbe

Vent du nord, gelées et sec ont stoppé la pousse alors qu'habituellement fin avril est synonyme d'une croissance intense. On se retrouve cette année avec plutôt un manque d'herbe. N'hésitez pas à augmenter la surface disponible au pâturage. En plaine, cela peut être fait sur les surfaces fauchées. En montagne, il est possible de pâturer des parcelles avec des hauteurs d'herbe hautes jusqu'à 17 cm que vous aviez éventuellement écarté du tour de pâturage. La pousse de cette semaine sera encore limitée par le froid. Si aucune de ces solutions n'est possible chez vous, il est nécessaire d'augmenter la distribution de fourrage à l'auge. La croissance est de 29kg/j/ha. Elle permet de nourrir 1 à 2 VL /ha tout herbe. Avec 30 ares de disponible par vache, il faut apporter 7kg de MS à l'intérieur. A 20 ares, c'est plutôt 10-11kg de fourrages qu'il faut distribuer. Cette complémentarité en fourrage permet de limiter le surpâturage. visez une hauteur de sortie à la cheville.

Récolte précoce de l'herbe : assurer des stocks en réorientant des parcelles à foin en montagne.

Selon les stocks restant de l'année dernière, il est possible de récolter des parcelles au stade début épiaison en fauche précoce plutôt qu'au stade floraison en foin. Ainsi, ce fourrage de meilleure qualité couvrira les besoins des VL. Le manque de rendement sera compensé par plus de surfaces fauchées.



Sommes de températures : comment les utiliser ?


Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février



Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
 Contact : Florence FARGIER
 06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

