



A retenir cette semaine :

De 60°C à 100 °C cumulés cette semaine dans le département.

La pousse d'herbe est de 42 kg MS/ha/jour de moyenne sur le département, la période d'excédent arrive en plaine et coteaux ; accentuée par la pluie



Sommes de température :

Nettoyage / déprimage : 250 °C

Mise à l'herbe : 300 °C -> Forsythias en fleurs

Apport fauche tardive : 300-350°C

Ensilage herbe précoce type RGI : entre 650°C et 700 °C → floraison des Lilas



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe	
St Marcel de Félines, 490m	10,1 cm	36,9 kg	6/04	100 % pâture 30 ares / UGB
Violay, 700m	9,5 cm	38,5 kg	Jour / nuit	90 % d'herbe fraîche
Fontanès, 750m	9,6 cm	59 kg	07/04	½ ration d'herbe
St Christo En Jarez – 800m	8,6 cm	57 kg	18/03	1/3 ration à l'auge
St Héand, 700m	9 cm	49,8 kg	Jour / nuit	3/4 herbe pâturée
Savigneux, 400m	9 cm	36,6 kg	17/03	1/2 ration d'herbe
Apinac, 1000 m	6,6 cm	17 kg	13/04	¼ herbe fraîche
Parigny	Pâturage jour +	Nuit	18/02	100 % herbe pâturée
St Galmier	-	-	Jour / nuit	3/4 herbe + foin



Du côté de la technique : la valeur alimentaire du fourrage

Afin d'améliorer la teneur en protéines des ensilages d'herbe, l'implantation de légumineuses dans les RGI est une solution. L'association avec de la vesce velue est un bon compromis entre valeur, rendement et précocité afin d'optimiser la récolte du ray-grass ; la fertilisation doit être ajustée en fonction du mélange présent !

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Avril
Bard	557	20,6
Burdignes	363	53,2
Noirétable	575	42,8
St Sauveur en Rue	565	54,7
Violay	588	19,6



Montagne et plateaux

Le déprimage doit être terminé en dessous de 1000 m !

Les animaux sont sortis et le premier tour doit être en cours ; le choix des parcelles à conserver pour la fauche se finalise

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Avril
Fourneaux	684	28,2
La Valla en Gier	660	16
Panissières	656	15
St Georges en Couzan	618	25,8



Coteaux

Les premières coupes de ray-grass allent rendement et valeur alimentaire vont pouvoir se réaliser fin avril dans de bonnes conditions.

Le débrayage de parcelles supplémentaires en fauche est nécessaire pour éviter un gaspillage de l'herbe

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Avril
Arthun	658	8,6
Balbigny	696	13,6
Nandax	711	23,6
Pélussin	748	28,9
Savigneux	669	12,4
Veauchette	688	10,6



Plaine

Les 700 °C sont atteints, et avec la floraisons des lilas ; les premières coupes sont à récolter ! Des parcelles de prairies peuvent être fauchées afin de revenir dans le circuit de pâturage dans 3 semaines, en complément ou remplacement d'autres

Source infoclimat / météo France au 23/04/2022



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez