

# Bulletin Info Prairie n°3 du 21 février 2022



**Sommes de températures :**  
 Lisier : 8 semaines min. avant utilisation  
 Fumier : 3 mois avant utilisation  
 Apport minéral si besoin : entre 200°C  
 base 1<sup>er</sup> janvier et 200 °C  
 Base 1<sup>er</sup> février

## A retenir cette semaine :

Plus de 60°C cumulés cette semaine en plaine, après un début d'année en retard d'une dizaine de jours, 2022 revient au niveau des normales.

Terminer l'organisation des paddocks (découpage, points d'eau)...

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. février
Bard	104°C	12,6 mm
Burdignes	62°C	62,4 mm
Noirétable	108°C	72,8 mm
St Sauveur en Rue	95°C	38,3 mm
St Georges en Couzan	113°C	13,4 mm
Violay	99°C	38 mm
Fourneaux	124°C	33,9 mm
La Valla en Gier	120°C	20,6 mm
Panissières	119°C	26,4 mm
Arthun	126°C	7 mm
Balbigny	132°C	15,4 mm
Nandax	134°C	27 mm
Pélussin	133°C	21,9 mm
Savigneux	129°C	5 mm
Veauchette	133°C	9,6 mm

### Montagne et plateaux

**Les apports de fumiers sont toujours réalisable. Un délais de 3 mois est nécessaire entre l'épandage et la 1<sup>ère</sup> utilisation.**

### Coteaux et plaine

**Les 200°C cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier devraient être atteint les premiers jours de mars jusqu'à 600 m d'altitude.**

### Plaine et coteaux

**Le repère 200°C cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier a été atteint le 20/02. Ces apports sont possibles durant une dizaine de jour au vu des prévisions annoncées dans les 10 prochains jours.**

### Du côté de la technique

Valorisation des matières organique : les apports recommandés sont de 10-15 T/ha de compost, 15-20 T/ha de fumier et 20-25 m3/ha de lisier afin de couvrir l'essentiel des besoins des prairies en P et K.

Réseau suivi croissance d'herbe :  
 5 exploitations seront suivies cette année. Toutes les parcelles pâturées par les vaches laitières seront mesurées toutes les semaines sur la période du printemps. Les premières mesures vont être réalisées afin de faire le point sortie hiver.

