



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°2 – semaine 11 – lundi 11 mars 2019

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 10/03/19

### Boën - 430m

Somme de t° : 259°C à partir du 01 février

### Charlieu - 279m

Somme de t° : 265°C à partir du 01 février

### Violay - 830m

Somme de t° : 254°C à partir du 01 février

### Bard - 810m

Somme de t° : 253 °C à partir du 01 février

### Cottance - 500m

Fumier apporté en janvier, herse passée le 20 février  
Le déprimage devrait débuter en fin de semaine

### Grammond - 804m


Somme de t° : 250°C à partir du 01 février

### Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 259°C à partir du 01 février

### Pélussin - 400m

Somme de t° : 276 °C à partir du 01 février



## Préparez la saison

La reprise de végétation est démarrée !

La période d'épandage du premier apport d'azote est atteinte dans la majorité du département : pensez à le réaliser si ce n'est déjà fait ; les conditions de portance sont très bonnes.

Le déprimage des parcelles peut débuter, il permet :

- \*d'éliminer les feuilles poussées cet hiver
- \*de décaler la précocité de certaines parcelles
- \*de démarrer le pâturage en douceur assurant ainsi une transition alimentaire

Cela permet de réaliser des économies : 2 à 3 kg de ms ingérés par jour, un temps de présence en bâtiment plus faible (litière). Tout ce que les vaches consommeront maintenant sera du bonus ; car en cas de nouvelle période froide ou neigeuse, la végétation actuelle sera perdue !!

Quels sont les actions pour préparer ses prairies ?

- Emoussage ou hersage : cette technique doit être terminée pour les parcelles de pâture
- Epandage de lisier : à réserver aux parcelles de fauches
- Gestion des paddocks : Mettre en place les clôtures pour délimiter les parcelles. Prévoir les entrées et les points d'eau. Définir son calendrier de pâturage en fonction de l'exposition et de la surface disponible

## Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

### Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1<sup>er</sup> janvier et 200° base 0-18° au 1<sup>er</sup> février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1<sup>er</sup> février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT  
slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE  
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE

