



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°8 – semaine 18 – lundi 30 avril 2018

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 28/4/18

Boën - 430m

Somme de t° : 660° à partir du 1^{er} février

St Bonnet Le Courreau - 1050m

Croissance : 76 kg MS/j/ha (116 kg/j/ha sur 15j)

Bard - 810m

Somme de t° : 543° à partir du 1^{er} février

St Maurice en Gourgois - 780m

Croissance : 86 kg MS/j/ha (72 kg MS/j/ha)

Toujours une pousse très importante

107kg de MS/j/ha de moyenne de pousse sur le département cette semaine !

- **En plaine**, les ensilages ont débuté. **En zone de coteaux**, les prairies temporaires sont à surveiller. N'hésitez pas à faucher vos parcelles destinées au pâturage qui présentent plus de 15 cm d'herbe et qui ne seront pas prévues en pâture dans la semaine.

Quelques rappels pour un ensilage de qualité :

- **Faucher à plus de 7 cm !** Cela contribue à une bonne circulation de l'air et un bon séchage de l'andain. De plus à 7 cm la repousse sera plus rapide et la parcelle pourra réintégrer votre rotation de pâturage assez rapidement.
- **Bien tasser son silo !** Prévoir autant de tracteurs au silo que d'hectares fauchés à l'heure. Un **tassage en U** de votre silo permettra une pression plus élevée contre les murs de votre silo et diminuera ainsi le risque de pertes à l'ouverture.
- Un conservateur peut être ajouter pour des fourrages pauvres en sucres, notamment la luzerne.
- **En montagne**, tous les troupeaux doivent être sortis. La pousse est soutenue, si la **fin du premier tour de pâture** tarde un peu, n'hésitez pas à réserver les parcelles les plus hautes et les mieux exposées pour la fauche. Une fauche précoce permettra de les réintroduire assez rapidement dans la rotation.

Charlieu - 279m

Somme de t° : 668° à partir du 1^{er} février

Nandax - 330m

Intégration de parcelles ensilées le 21/04
Croissance : 104 kg MS/J/ha (117 kg/j/ha sur 15j)

St Denis sur Coise - 480m

Les vaches ont eu accès à l'ensemble des parcelles mesurées

Grammond - 804m


Somme de t° : 542° à partir du 1^{er} février

Doizieux - 650m

Croissance : ----

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 658° à partir du 1^{er} février



Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.


Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février



Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Amélie Bonthoux 04.77.54.44.98

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE

