



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°12 – semaine 21 – lundi 20 mai 2019

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 18/05/19



### Boën - 430m

Somme de t° : 976°C à partir du 01 février

### Crémeaux - 700m

Pousse d'herbe 40 à 70 kg MS/ha/jour  
Les ensilages doivent se réaliser

### Bard - 810m

Somme de t° : 776°C à partir du 01 février

### Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 914°C à partir du 01 février

### Usson en Forez - 900m

Pousse d'herbe hétérogène de 10 à 75 kg MS/ha/jour suivant exposition et le froid

### St Maurice en Gourgais - 600m

Pousse d'herbe 45 kg MS/ha/jour en augmentation mais toujours ralentie par le froid

### Charlieu - 279m

Somme de t° : 920°C à partir du 01 février

### Violay - 830m

Somme de t° : 813°C à partir du 01 février

### Cottance - 500m

Pousse d'herbe 30-50 kg MS/ha/jour sur PN et entre 80 et 100 kg MS/ha/jour pour les RGI

### Yzeron - 700m

Somme de t° : 856°C à partir du 01 février

### Grammond - 804m

Somme de t° : 826°C à partir du 01 février

### Pélussin - 400m

Somme de t° : 1008°C à partir du 01 février

### Point météo :

- sommes de températures : de moins en moins d'avance en lien avec un mois de mai froid
- pluviométrie : temps vert sans grosses précipitations

### Que faire cette semaine :

- Les croissances d'herbe sont toujours hétérogènes et lente en lien avec la météo de ce mois de mai.
- En plaine (400m) : début des 2<sup>ème</sup> coupe notamment pour les RGI ensilés début avril.
- Zone de coteaux (600m) : le seuil des 850°C est atteint, les 1<sup>ères</sup> coupes doivent se terminer.
- Montagne (>800m) : les 1<sup>ère</sup> coupe sont à réaliser quand il y aura une fenêtre météo convenable.

### Essai méteils – récoltes précoces – St Cyr les Vignes :

La récolte des méteils avec beaucoup de céréales a eu lieu cette semaine. Vous pourrez retrouver les valeurs sur notre site. Stades de récolte :

- Méteils très céréaliers, dès épiaison des céréales
- Méteils protéagineux, dès floraison du pois

**Gestion des refus :** pour éviter de gaspiller de l'herbe en ce printemps moyennement productif, la gestion des refus peut se faire par la pratique du topping : Faucher le paddock dans l'après-midi la veille du pâturage, les vaches mangeront ainsi la quasi-totalité de l'herbe présente, même épiée ! En effet, la fauche enlève l'amertume de l'herbe et cette pratique permet de maîtriser les adventices (chardons, rumex...)

### Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

**Ensilage / enrubannage / foin ventilé :** 700° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février (550°C pour les RGI)

**Foin précoce :** 1 000°C

**Foin tardif :** 1 200°C

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

[slaurent@loire-conseil-elevage.fr](mailto:slaurent@loire-conseil-elevage.fr)

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

[Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr](mailto:Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr)

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE  
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
& DE LA PÊCHE  
ET DE LA RURALITÉ