



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°10 – semaine 19 – lundi 06 mai 2019

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 15/04/19

### Boën - 430m

Somme de t° : 801°C à partir du 01 février

### Crémeaux - 700m

Pousse d'herbe lente : 40 kg MS/ha/jour  
Les RGI ont atteints le stade de récolte

### Bard - 810m

Somme de t° : 661°C à partir du 01 février

### Andrézieux Bouthéon - 400m


Somme de t° : 759°C à partir du 01 février

### Usson en Forez - 900m

Pousse d'herbe moyenne : 40 à 50 kg MS/ha/jour  
Fin du 1<sup>er</sup> tour, repousse lente

### St Maurice en Gourgois - 600m

Pousse d'herbe ralentie  
Repousse difficile



### Charlieu - 279m

Somme de t° : 760°C à partir du 01 février

### Violay - 830m

Somme de t° : 690°C à partir du 01 février

### Cottance - 500m

Pousse d'herbe faible : 25 kg MS/ha/jour  
Les RGI ensilés fin avril ont bien redémarré

### Yzeron - 700m

Somme de t° : 728°C à partir du 01 février

### Grammond - 804m

Somme de t° : 700°C à partir du 01 février

### Pélussin - 400m

Somme de t° : 869°C à partir du 01 février

### Point météo :

- sommes de températures : températures faible entrainant une pousse plus faible et une difficulté à obtenir des taux de MS élevés lors des récoltes
- pluviométrie : en raison des passages pluvieux fréquents, les créneaux de récoltes sont courts

### Que faire cette semaine :

- Les croissances d'herbe sont toujours hétérogènes selon les zones du département, elles peinent à s'accélérer avec le manque de chaleur.
- En plaine (400m) : les ensilages des PT doivent se terminer ; les 2<sup>ème</sup> coupe de RGI récoltées précocement (fin mars) vont être à réaliser dans les 10 jours.
- Zone de coteaux (600m) : les ensilages doivent se faire pour optimiser la qualité du fourrage, même si la quantité n'est pas au rendez-vous.
- Montagne (>800m) : La pousse est moyenne et les repousses lentes
- Dans tous les cas, privilégiez la fauche lorsque le stade est atteint ; cela assurera la qualité en favorisant une deuxième coupe

### Essai méteils – récoltes précoces – St Cyr les Vignes :

Retrouvez le bulletin spécial méteils sur notre site

### Les Conservateurs d'herbe

Pour limiter le développement des butyriques dans les ensilages, on peut envisager d'ajouter un conservateur pour favoriser la baisse du pH : 2 solutions, acide formique Ou bactéries homo fermentaires produisant des acides lactiques

### Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

**Fin de déprimage et fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage à 500° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février**

**Ensilage / enrubannage / foin ventilé : 650-700° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février (550°C pour les RGI)**

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

[slaurent@loire-conseil-elevage.fr](mailto:slaurent@loire-conseil-elevage.fr)

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

[Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr](mailto:Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr)

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE  
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'ALIMENTATION  
DE LA PÊCHE  
ET DE LA RURALITÉ