



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°16 – semaine 25 – lundi 17 juin 2019

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 15/06/19



Boën - 430m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Crémeaux - 700m
Pousse d'herbe assez active de 50 à 60 kg MS/ha/jour ; Foins à réaliser 40 mm la semaine passée

Bard - 810m
Somme de t° : 1159°C à partir du 01

Andrézieux Bouthéon - 400m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Usson en Forez - 900m
Milieu de 3^{ème} tour de pâturage ; 67 mm la semaine dernière ; Les foins vont pouvoir démarrer

St Maurice en Gourgais - 600m
Poursuite du pâturage avec gestion des refus ; foins à réaliser

Charlieu - 279m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Violay - 830m
Somme de t° : 1176°C à partir du 01 février

Cottance - 500m
Pousse d'herbe limitée à 20 kg MS/ha/jour par manque d'eau ; foins en cours ; environ 55 mm d'eau ; 3^{ème} coupe longue à redémarrer

Yzeron - 700m
Somme de t° : 1233°C à partir du 01 février

Grammond - 804m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Pélussin - 400m
Somme de t° : 1431°C à partir du 01 février

Point météo :

- sommes de températures : conditions météo normales plus favorable à la pousse et dans la moyenne des normales saisonnières
- pluviométrie : les pluies récentes ont relancées la pousse de l'herbe et devrait permettre de pâturer au moins jusqu'à fin juin
- la semaine est annoncée chaude avec des orages sur la fin

Que faire cette semaine :

- En plaine (400m) : fin de récolte des foins et début des 3^{ème} coupe sur ray-grass
- Zone de coteaux (600m) : la période pour le foin est idéale pour les fauches tardives ou déprimées ainsi que les 2^{ème} coupes
- Montagne (>800m) : début des foins et gestions des refus

Alimentation estivale :

Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la saison de pâturage, il est possible d'envisager le semis de dérobée sur des parcelles libérées derrière une céréale : Avant le 10 juillet :

- Sorgho fourrager : 25 kg /ha
- Moha + trèfle d'alexandrie : 18 à 20 kg + 3 à 5 kg /ha

Avant fin aout :

- RGI alternatif diploïde : 22 à 25 kg/ha
- Colza fourrager : 8 à 10 kg/ha

Semer le plus rapidement possible après la récolte pour profiter de l'humidité résiduelle et peu profond (1 à 2 cm) pour une levée rapide

Fertiliser pour favoriser la pousse (40 à 60 u d'azote)

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Ensilage / enrubannage / foin ventilé : 650-700° base 0-18 au 1^{er} février (550°C pour les RGI)

Foin précoce : 1 000°C

Foin tardif : 1 200°C

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
Contact : Stéphane LAURENT
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>
Contact : Pierre VERGIAT
 pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
 Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

