Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°15 – semaine 21 – lundi 18 MAI 2020

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 17/05/20

Roanne –336m
Somme de t° : 1067 + 79°C

Arthun - 350m
Somme de t° : 1036°C +77°C

Bard – 810m
Somme de t° : 925°C +63°C

Savigneux – 380m
Pousse : 47 kg ms d'herbe /ha/jour

St Bonnet le Chateau – 870m
Somme de t° : 894°C +62°C

St Maurice en Gourgois – 600m
Hauteur moyenne : 9 cm
Croissance à 48 kg MS/ha/jour
Pâture jour et nuit – 1ère coupe 08/05



Ressins – 330 m
Pousse : 50 kg ms d'herbe /ha/jour

Parigny – 400 m
Pousse : kg ms d'herbe /ha/jour

Violay – 830m
Somme de t° : 953°C +62°C

Panissières – 600 m
Pousse : 62 kg ms d'herbe /ha/jour

St Etienne Andrézieux – 400m
Somme de t° : 1104°C +80°C

Chazelles sur Lyon – 550 m
Pousse : kg ms /ha/jour

Veauchette – 360m
Somme de t° : 1082°C +79°C

Pélussin – 400m
Somme de t° : 1141°C +89°C

Point météo :
Malgré les conditions fraiches de ces 10 derniers jours, les deux semaines d'avance se maintiennent. Cette semaine est annoncée sans précipitation et avec le retour à des températures de saison voir même au-dessus, une centaine de degrés devraient être cumulés en plaine cette semaine.

Croissance de l'herbe :
- les pluies récentes et les températures devraient être favorables à une forte croissance de l'herbe.
- Les parcelles avec une hauteur d'herbe de plus de 10-12 cm doivent être fauchées pour avoir de nouvelles pousses dans trois à quatre semaines.

Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs
- Zone de plaine (400-600m) : le seuil des 1 200°C devrait être attient la semaine prochaine, les foins tardifs vont pouvoir se réaliser.
- Zone de coteaux (600-800m) : les 1000°C seront atteint cette semaine, les foins précoces vont pourvoir commencer.
- Zone de montagne (> 800m) : poursuite des premières coupes.

Zoom technique : gestion des refus
Il existe différentes solutions. Le choix va dépendre de la quantité de refus. Par ordre de préférence : fauche et ramassage, vient ensuite la fauche puis laisser sécher le fourrage et repasser les vaches (en pâturage de nuit par exemple) ou un lot de génisses. Enfin, le broyage est la technique venant en dernière position. Si la quantité d'herbe broyée est importante, elle risque de créer un mulch qui va pénaliser les repousses et ainsi augmenter la zone de refus.

Rappel : pérennité de la prairie, du matériel… hauteur de fauche 7 cm…

Gestion de la pâture ?

En période de pleine pousse de l'herbe et de récolte, n'hésitez pas à faucher 1 ou 2 parcelles à 12-15 cm d'herbe pour éviter d'être dépassé tout en gardant suffisamment de surface en repousse pour les semaines à venir ! Il faudra ensuite intégrer des parcelles fauchées en première coupe pour agrandir la surface disponible et allonger le temps de repos pour respecter le cycle de l'herbe. Cela permettra aussi de nettoyer certaines parcelles en récoltant les refus en foin ; celui-ci, de qualité moyenne pourra se destiner à des animaux à faible besoin : génisses gestantes, vaches taries…

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

LOIRE CONSEIL ÉLEVAGE

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE