



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°1 – semaine 5 – lundi 3 FEVRIER 2020

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} janvier. Source Météo France 31/01/20

Arthun - 350m

Somme de t° : 160°C à partir du 01 janvier

Bard - 810m

Somme de t° : 140°C à partir du 01 janvier

St Maurice en Gourgis - 600m

St Bonnet le Château - 870m

Somme de t° : 130°C à partir du 01 janvier

Roanne - 336m

Somme de t° : 175°C à partir du 01 janvier

Violay - 830m


Somme de t° : 150°C à partir du 01 janvier

Veauchette - 360m

Somme de t° : 170°C à partir du 01 janvier

Pélussin - 400m

Somme de t° : 180°C à partir du 01 janvier



Point météo :

- sommes de températures : avance de plus de 15 jours par rapport à 2019,
- pluviométrie : déficit de 15 à 20 mm depuis le 01/01 par rapport « aux normales »
- prévision pour début février : températures douces, après-midi « de saison », pas de pluie significative

Que faire cette semaine :

- En plaine (400m) et zone de coteaux (600 m) : le seuil des 200°C va être atteint pour démarrer la fertilisation azoté. Avec les températures annoncées cette semaine, il est temps de penser à ses prairies.
- Montagne (800m) : les 200 °C devraient être atteint autour du 15 février

Zoom technique : le premier apport

- Sur prairie, celui-ci sert à aider la végétation à redémarrer
- un apport de 25 à 40 unités d'azote est suffisant, adapter la dose en fonction d'un éventuel apport d'effluents à l'automne
- dans les cas de reliquats de végétation trop important, privilégier la sortie précoce d'un lot d'animaux avant de réaliser cet apport
- Pensez à respecter la réglementation en terme de date d'apport dans le cas de territoires sensibles (zone nitrate)
- Le fractionnement de l'apport azoté n'est nécessaire qu'au-delà de 60 unités

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Un correctif de + ou - 0.6 °C par jour peut-être appliquer par 100 m d'altitude de différence par rapport à la station la plus proche

L'exposition des parcelles doit aussi être pris en compte pour commencer par celle se réchauffant plus vite

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE