# Observer pour des fourrages de qualité

# Note Fourrages

## Un réseau régional pour faciliter vos décisions

**Note N°20 – semaine 26 – lundi 22 Juin 2020**

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 21/06/20

**Roanne –336m**
Somme de t° : 1546**°C** + 100°C

**Arthun - 350m**
Somme de t° : 1507**°C** + 97°C

**Bard – 810m**
Somme de t° : 1388**°C** + 93°C

**St Bonnet le Chateau – 870m**
Somme de t° : 1321**°C** + 82°C

**St Maurice en Gourgois – 600m**
Hauteur moyenne : 8.2 cm
Croissance à 22 kg MS/ha/jour
Fauche des refus

**Ressins – 330 m**
Pousse : 35 kg ms d'herbe /ha/jour

**Violay – 830m**
Somme de t° : 1421**°C** + 98°C

**Panissières – 600 m**
Pousse : 20 kg ms d'herbe /ha/jour

**St Etienne Andrézieux – 400m**
Somme de t° : **1 652°C** +111°C

**Veauchette – 360m**
Somme de t° : 1558**°C** + 98°C

**Pélussin – 400m**
Somme de t° : 1686**°C** + 112°C

***Point météo :***

Une vague de chaleur est annoncée cette semaine avant de nouveau une dégradation orageuse pour le weekend prochain.
L'avance se réduit à 11 jours en raison des températures largement en dessous des normales pour ce mois de juin. Le seuil des 1200°C devrait être atteint cette semaine pour les secteurs les plus hauts du département.

***Croissance de l'herbe :***

Les croissances sont toujours faibles pour la saison. A cette période la croissance moyenne observée depuis 2011 est de 48 kg MS/ha/jour.
Plusieurs options sont possibles :
- agrandir le tour de pâture avec les parcelles de fauches en attendant au minimum trois semaines de repousses
- et/ou augmenter la complémentation à la pâture.

L'agrandissement du tour de pâture permettra de laisser un temps de repousse plus long entre deux passages. Une quarantaine de jours entre deux passages est une bonne moyenne.

***Zoom technique : les dérobées estivales***

Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la saison de pâturage, il est possible d'envisager le semis de dérobée sur des parcelles libérées derrière une céréale :
Avant le 10 juillet : sorgho fourrager ou millet perlé (25 kg/ha) + trèfle d'Alexandrie (5 kg /ha)
Avant fin aout : RGI alternatif diploïde (25 kg/ha) ou colza fourrager (10 kg/ha)
Semer le plus rapidement possible après la récolte pour profiter de l'humidité résiduelle et peu profond (1 à 2 cm) pour une levée rapide - Fertiliser pour favoriser la pousse (40 à 60 u d'azote)

**Rappel : pérennité de la prairie, du matériel… hauteur de fauche 7 cm…**

**Bilan fourrager, ou en êtes-vous dans vos stocks ?**

La période de semis des dérobées est bientôt arrivé, il est temps de faire un premier état des stocks.
Les besoins en kg MS/jour sont de :
- bovin adulte : entre 15 et 17 kg MS/jour,
- génisses de plus de 2 ans : 10 kg MS/jour,
- génisses de 1 à 2 ans : 7 kg MS/jour,
- génisses de moins de 1 an : 4 kg MS/jour
- caprin et les ovin : entre 1.7 et 2.2 kg MS/animal/jour.

Les stocks :
- Ensilage d'herbe : 225 kg MS/m3 (30%MS, silo 1.5m de haut)
- Enrubannage : 240 kg MS/balle ronde de 120x120 à 60% MS
- Foin : 170 kg MS/balle ronde de 120x120


Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez


LOIRE CONSEIL ÉLEVAGE

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE