



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°21 – semaine 27 – lundi 29 Juin 2020

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 28/06/20

### Roanne – 336m

Somme de t° : 1666°C + 120°C

### Arthun - 350m

Somme de t° : 1621°C + 114°C

### Bard – 810m

Somme de t° : 1504°C + 116°C

### Savigneux – 380m

Pousse : 27 kg ms d'herbe /ha/jour

### St Bonnet le Chateau – 870m

Somme de t° : 1431°C + 110°C

### St Maurice en Gourgis – 600m

Hauteur moyenne : cm  
Croissance à 17 kg MS/ha/jour  
Fauche des refus

### Ressins – 330 m

Pousse : 25 kg ms d'herbe /ha/jour

### Violay – 830m

Somme de t° : 1539°C + 118°C

### Panissières – 600 m

Pousse : 25 kg ms d'herbe /ha/jour

### Veauchette – 360m

Somme de t° : 1678°C + 120°C

### Pélussin – 400m

Somme de t° : 1811°C + 127°C

### Point météo : station Andrézieux

Finalement le mois de juin aura été conforme aux normales de saisons au degré près. Côté précipitations, il est tombé 122 mm en juin (pour une normale à 78 mm) permettant ainsi de combler en partie le déficit depuis le 01/01.

Malgré la présence de nombreux orages de ce mois de juin, l'indice d'humidité des sols en surface reste en dessous de la moyenne pour notre département.

Tendance pour cette semaine : chaude en début de semaine et en dessous des normales pour la fin de semaine avec le retour des orages.

Tendance saisonnière : globalement un été conforme aux normales de saison...

### Croissance de l'herbe :

Nous arrivons dans la période où la pousse de l'herbe va être comprise entre 0 et 25 kg de pousse par jour ; il est donc nécessaire d'adapter la surface et la complémentation au besoin des animaux et ne surtout pas leur laisser à disposition de grande surface de prairies : le surpâturage et l'épuisement de la prairie entraîne sa destruction

### Zoom technique : les dérobées estivales

Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la saison de pâturage, il est possible d'envisager le semis de dérobée sur des parcelles libérées derrière une céréale :

Avant le 10 juillet : sorgho fourrager ou millet perlé (25 kg/ha) + trèfle d'Alexandrie (5 kg/ha)

Avant fin août : RGI alternatif diploïde (25 kg/ha) ou colza fourrager (10 kg/ha)

Semer le plus rapidement possible après la récolte pour profiter de l'humidité résiduelle et peu profond (1 à 2 cm) pour une levée rapide - Fertiliser pour favoriser la pousse (40 à 60 u d'azote)

**Rappel : pérennité de la prairie, du matériel... hauteur de fauche 7 cm...**

### Bilan fourrager, ou en êtes-vous dans vos stocks ?

La période de semis des dérobées est bientôt arrivé, il est temps de faire un premier état des stocks.

Les besoins en kg MS/jour sont de :

- bovin adulte : entre 15 et 17 kg MS/jour,
- génisses de plus de 2 ans : 10 kg MS/jour,
- génisses de 1 à 2 ans : 7 kg MS/jour,
- génisses de moins de 1 an : 4 kg MS/jour
- caprin et les ovin : entre 1.7 et 2.2 kg MS/animal/jour.

Les stocks :

- Ensilage d'herbe : 225 kg MS/m<sup>3</sup> (30%MS, silo 1.5m de haut)
- Enrubannage : 240 kg MS/balle ronde de 120x120 à 60% MS
- Foin : 170 kg MS/balle ronde de 120x120

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez