



Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE

Note Patur'RA

Note N°2 – semaine 07 – lundi 15 février 2021



La Chapelle de Mardore-650M

Cumul température base 0-18 au 01/01 : 158°C

Bibost- 400 M

Cumul température base 0-18 au 01/01 : 175°C

Villechenève-670M


Cumul température base 0-18 au 01/01 : 158°C

St Martin en Haut-750 M

Cumul température base 0-18 au 01/01 : 134°C

Longes -400 M

Cumul température base 0-18 au 01/01 : 191°C





Avec les températures annoncées ces prochains jours, les 200°C de cumul nécessaires au 1^{er} apport d'azote se rapprochent sur la plupart des secteurs. La pluie tombée plus ou moins abondamment, va poser quelques soucis de portance des sols selon le type de terrain. Le gel de ces derniers jours a permis d'améliorer ceci. N'hésitez pas à consulter le site **DateN'Prairie** d'Arvalis qui vous permet de connaître le cumul de températures sur votre commune.

Le 1^{er} apport d'azote va permettre de stimuler la pousse et d'augmenter la vitesse de croissance de la plante. Il vient combler le déficit de minéralisation dans le sol à cette période de l'année. Un 2nd apport permettra lui d'améliorer les valeurs protéiques du fourrage. La stratégie en un ou deux apports dépend de la date du 1^{er} passage et de la date de récolte potentielle. Si le laps de temps entre le 1^{er} apport et la récolte est supérieur à 8 semaines, le fractionnement est conseillé. Dans ce cas-là, on veillera à apporter 2/3 de l'apport la 1^{ère} fois.

Voici quelques repères de fertilisation minérale :

- **Pâturage** : 100-150 kg d'ammonitrate/ha valorisé pour améliorer la précocité de démarrage.
- **Ensilage** : sur un RG semé à 30 kg de densité, récolté à hauteur de genou avant épiaison avec un objectif à 3.5T MS :
 - En 1 apport, 250-280 kg d'ammonitrate
 - En 2 apports, 200kg au 1^{er} passage et 100 kg au 2^{ème}.

Pour tous vos apports de fertilisants, la date est bien sûre à prendre en compte mais les conditions d'épandage restent primordiales. Avec des sols peu ressuyés, il est plus prudent d'attendre quelques jours plutôt que de se précipiter et abîmer le sol. Le 2^{ème} passage peut être effectué 3-4 semaines après le 1^{er} apport mais également au moins 5 semaines avant la date de récolte de l'herbe pour éviter d'avoir trop d'azote soluble dans les ensilages ou enrubannages. Cela peut engendrer des problèmes de MS, de protéolyses et donc de conservation des stocks. Les fumures organiques les plus efficaces au printemps sont les suivantes : lisier de bovin, lisier de porc, fumier de volaille et digestat. Les fumiers de bovins et compost sont à privilégier sur un apport d'automne. Attention à ne pas sur fertiliser, ce qui rendra la plante plus sensible à la verse et accélèrera la montée à l'épi en cas de stress.



Contact

Laurine DESMARIS

Port : 06 84 11 43 60

Mail : ldesmaris@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

Rhône Conseil Elevage - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

