

Cumuls des températures au 16/04/2017 (source météo France)

Bas-Vivarais		Moyen/Haut-Vivarais		Montagne	
250 m	850	400 m	712	900 m	525
350 m	805	500 m	669	1000 m	475
450 m	760	600 m	624	1100 m	438
550 m	715	700 m	579	1200 m	395
650 m	670	800 m	534	1300 m	353
Gain/semaine	+110°C	Gain/semaine	+91°C	Gain/semaine	+67°C
Avance/an dernier	14 jrs	Avance/an dernier	16 jrs	Avance/an dernier	25 jrs

Observations : augmentation des cumuls de températures la semaine dernière, en particulier sur les zones basses. Le manque de précipitations se fait sentir sur les coteaux. Météo-France prévoit une forte baisse de températures, mais pas d'épisode de pluie sérieux envisagé.

Préconisations

Sur le Bas-Vivarais : Compte tenu de la météo (vent, ensoleillement) réaliser les premières coupes de foin.

Sur le Haut-Vivarais : c'est l'heure des ensilages jusqu'à 600 m d'altitude. Les conditions sont propices à la réalisation de silos de qualité. **Pour les éleveurs en AOP Picodon , il est possible de réaliser des foins fanés au sol de très bonne qualité compte tenu des conditions météo : c'est une opportunité à saisir.** Au pâturage, le second tour doit être une réalité jusqu'à 800 m.

Sur la Montagne : malgré le retour du gel, il est temps de mettre à l'herbe jusqu'à 1200 m (la semaine prochaine à 1300 m), en particulier en production laitière. Si l'herbe est peu abondante, faire pâturer les après-midi et aménager une transition alimentaire en conservant du fourrage distribué à l'intérieur.

Quelques rappels sur les sommes de températures

Le développement de l'herbe est conditionné par la température. Chaque semaine, nous vous indiquons les cumuls de températures réalisés depuis le 1er février dont voici les principaux repères :

- **300°C :** c'est la mise à l'herbe sur prairie normalement fertilisée. Sur RGI et prairie précoce ce repère est de 250°C.

- **500°C :** c'est la fin des déprimages, un pâturage au-delà de ce seuil limite fortement les chances de repousses et le rendement de la coupe.

- **750°C :** c'est le stade repère pour les coupes précoces (ensilage, séchage en grange...) qui correspond au début épiaison sur les prairies naturelles précoces et fertiles. **Sur prairie temporaire à base de RGI ou RGH, on peut avancer à 650°C** en fonction de la quantité disponible.

- **1000°C :** c'est le stade repère pour déclencher les foins.

Le date du 1er février correspond à un allongement suffisant de la durée du jour qui va permettre le réveil de la végétation si les conditions le permettent (température, eau).

Visites méteils protéiques

La Chambre d'agriculture et ACE ont mis en place des essais de méteils protéiques sur le nord Ardèche. Nous vous invitons à venir échanger sur ce thème :

- **Mardi 25 avril à partir de 14h00** – St Jeure d'Ay - Gaec Ribes, en agriculture bio – Lieu-dit Beaulieu (direction lac des Meinettes depuis Marsan ou St Jeure)

- **Mercredi 26 avril à partir de 14h00** – Alboussière - Gaec de Deyras en conversion bio – Lieu-dit Le Col du Serre parcelle sous la route.

Renseignements :

Katleen Petit : 06 77 34 96 46 - Emmanuel Forel : 06 85 10 09 96