



Suivi de croissance de l'herbe pour une bonne maîtrise du pâturage


Dans les secteurs précoces, la mise à l'herbe a eu lieu dans des conditions idéales, le sol est portant, les conditions sont réunies pour faire un premier tour rapide des parcelles. Les relevés de hauteur d'herbe ont débuté dans les Monts du Lyonnais. La semaine dernière, la quantité d'herbe disponible était d'environ 38 Kg MS par hectare.

Dans les secteurs plus tardifs, les cumuls de températures devraient bientôt dépassés les 250°C.

Même si la quantité d'herbe semble faible, il faut lâcher et profiter des conditions de portance. La transition alimentaire sera facile à maîtriser et les animaux seront moins perturbés si les conditions climatiques se dégradent plus tard. Dans un premier temps, il faut adapter la quantité de ration distribuée à l'appétit des vaches, et baisser assez rapidement le correcteur azoté.

La mise à l'herbe précoce permettra aussi de mettre de la souplesse dans la gestion du pâturage et d'améliorer la qualité des repousses à venir. Toutefois, il est donc important de tourner rapidement sur les parcelles afin d'éviter le surpâturage préjudiciable à la pousse de l'herbe.

Yves Alligier, Loire Conseil Elevage et Pierre Vergiat, Chambre d'agriculture



Yves ALLIGIER (Loire Conseil Elevage)

Pierre VERGIAT (Chambre d'Agriculture de la Loire)