



Nos conseils pour une mise à l'herbe réussie

Certains troupeaux caprins sont à l'herbe depuis la mi-février. Mais avec le démarrage végétatif hétérogène de notre zone, tout le monde n'est pas sorti (prairies naturelles tardives, plus de 900m d'altitude, pluviométrie timide). Néanmoins, pour assurer à la fois une bonne transition (ration bâtiment à pleine pâture), et optimiser la consommation de l'herbe, il vaut mieux sortir tôt dans la saison et augmenter le temps de pâture sur deux à trois semaines, avec une hauteur d'herbe d'entrée minimale à 8 cm (niveau cheville). L'herbe est alors peu poussée et la transition alimentaire est moins risquée.

Exemple de pilotage pour la transition alimentaire :

	Temps de présence (en h)		Fourrages	Concentrés/Deshy
	Début	Fin		
1 ^{ere} semaine	1 à 2	4	Ration sèche : maintenir	↘ ou supprimer déshydratés
			Enrubannage : ↘ et remplacer rapidement (foin appétent)	
			Ration mélangée : ↗ fibrosité ou ↘ apport avec présence râtelier de foin	
2 ^e semaine	4	8	petit repas le matin, plus conséquent le soir	↘ apports protéiques, ↘ concentrés de 100 à 150g
3 ^e semaine	8		idem, voir repousser les refus de la veille le matin et adapter l'affouragement du soir	minimum 800g pour 3,5L de lait en 2 repas – 16 à 18% de protéines brutes

Gérer le parasitisme

En amont de la mise à l'herbe, une coproscopie à la fin de l'hiver permet d'avoir une vue sur la charge parasitaire de son troupeau. Au bout de 6 semaines de sortie, ou avant un changement de bloc, une nouvelle coproscopie permet d'estimer le risque d'infestation des nouvelles parcelles pâturées. Faire au moins deux lots de prélèvements de crottes (primis/multis), les primipares étant plus sensibles aux parasites. Si la charge est élevée, un traitement pourra être envisagé.

1ère sortie le 17 février pour les 200 chèvres de Sabine et Eric Palisse à St Barthélémy-le-Plain (07). Elles sont maintenant en ration pleine pâture avec 8h à l'herbe/jour.

Ils misent sur le pâturage



GAEC du COLONIER à Saint-Félicien (07)
2 associés, livreur, 250 chèvres, MB fin oct.



Nous pratiquons le pâturage tournant dynamique, avec des parcelles de 30 à 50 ares, 1 jour/parcelle. Elles commencent à sortir une à trois heures par jour début mars, pour rester début avril 7h dehors maximum. Le temps de retour par parcelle est de 15 à 20 jours. Les PT de graminées sont fertilisées début février (50U d'N) pour les démarrer.

Cette année, le troupeau est sorti au 1^{er} mars sur un mélange RGI/RGH/TV semé en septembre, il est passé au 9 mars sur prairies naturelles.

La ration mélangée est à 18,5% de MAT et 1UFL/kg de MS. En pleine pâture on diminue uniquement le nombre de parts distribuées (150 parts pour 250 chèvres début avril).

Dès que les chèvres sont mises à l'herbe, elles ne passent plus un jour dedans. Les jours de fortes pluies, si elles attendent pour sortir, les lâcher une ½ heure les stimule à manger dedans !

Nous faisons une coproscopie en juin et un traitement que si elles sont chargées. ”

Ça bouge dans les campagnes

