


Parcelles de Ray-Grass, où en sommes-nous ?

- **LONGES** : RG semés au 15/09. Azotés au 25/02 avec 70 unités. Épi dans la gaine à 25-30 cms.
- **GIVORS** : RG semés au 15/09. Azotés au 20/02 avec 80 unités. Stade épiaison. Récoltés le 15/04.
- **Plaine de MEYS** : épi 15-20 cms.
- **ST DIDIER/RIVERIE** : parcelles semées au 10/09, stade début épiaison sinon épi 25 cms.
- **ST MARTIN EN HAUT** : RG semés au 10/09, épi 5-10 cms.
- **BEAUJOLAIS** : RG semés au 15/10, épi 7-15 cms. Parcelles semées au 15/09, épi 20-25 cms.



Pâturage : besoin de faire le point selon vos surfaces

Cette semaine, comme prévu avec l'eau de la semaine précédente et le retour des chaleurs, nous avons eu une très forte augmentation de la croissance de l'herbe (+ 175%). **Il n'a jamais été aussi important de prendre le temps de réaliser un tour de parcelle hebdomadaire.** La pleine pousse se confirme. La croissance moyenne départementale dépasse les 50 kg MS/j/ha. Avec ces niveaux de croissance, les parcelles les plus poussantes peuvent progresser de plusieurs centimètres dans la semaine (+ 3 à 4 cms).


Le 1^{er} tour de pâturage doit être terminé ! Si ce n'est pas le cas, il va falloir réfléchir à une stratégie d'utilisation des parcelles non pâturées :

- Les écarter du tour de pâturage pour ne pas se faire dépasser si le stock d'herbe sur pied des autres parcelles est conséquent et que vous souhaitez une production de lait supérieure à 25 kgs.
- Si la production de lait attendue est inférieure à 25 kgs et que l'avance en herbe sur les autres parcelles n'est pas élevé, vous pouvez les faire pâturer au fil pour exercer une forte pression. Avec la concurrence, les VL consommeront plus facilement les plantes avancées.

Pour les élevages qui ont un bon rythme d'avancement sur leurs paddocks, il va falloir conserver cette bonne dynamique pour garder une consommation d'herbe de qualité et suivre la pousse de l'herbe, qui va rester haute cette semaine.

Avec les croissances faibles des dernières semaines, il n'existe que très peu de différence de hauteur entre les parcelles. La pousse va être identique sur la majorité du parcellaire et le risque de perdre en qualité va être important.

Il faudra être réactif pour ajuster la consommation et la surface accessible. Si le volume d'herbe est important (10-12 cm d'herbe à l'entrée des animaux dans la parcelle), n'hésitez pas à lâcher vos animaux directement après la traite avec le « ventre vide ». Ce phénomène incitera les VL à consommer un bon repas d'herbe en arrivant plutôt que de les voir se coucher si elles ont eu un repas à l'auge. Il faut aussi ajuster les quantités distribuées en fonction des ha disponibles et de la croissance approximative notée ci-contre.



- **Grands repas synchronisés du matin et du soir**
- **Petits repas plus désynchronisés l'après-midi**
- **Petits repas isolés à 2 h du matin**

Commune	T°C 0-18° 01/02	Croissance
Amplepuis	587°C	
Aveize	490°C	47,1 kg MS
Bessenay	615°C	72 kgs MS
La Chapelle de Mardore	539°C	50 kgs MS
Longes	682°C	71,4 kgs MS
Monsols	539°C	45,5 kgs MS
Meys	488°C	34,2 kgs MS
Villechenève	490°C	49,7 kg MS