


Observer pour des fourrages de qualité



Commune	T°C 0-18° 01/02	Croissance (Moyenne 15 jours)
Amplepuis	853°C	
Aveize	728°C	70,8 kgs MS
Bessenay	895°C	36 kgs MS (48,6 kg MS)
La Chapelle de Mardore	786°C	40 kgs MS (33,3 kg MS)
Longes	997°C	29,2 kgs MS (66 kg MS)
Monsols	786°C	66,4 kgs MS (62,1 kg MS)
Meys	727°C	29,2 kgs MS (29,6 kg MS)
Villechenève	728°C	53,8 kgs MS (47,8 kg MS)

Les 1ers chantiers de foin

Au vue des températures annoncées et de l'éloignement des épisodes pluvieux, nous voyons fleurir sur le département les 1ers chantiers de récolte de foin. Même si les rendements sont faibles, la qualité devrait être au rendez-vous. Il faut cependant rester très vigilant sur le séchage des bottes. Même si le soleil brille, les plantes restent « jeunes » et mettent plus de temps pour sécher.

Contact: Laurine DESMARIS, 06 84 11 43 60 / ldesmaris@cmre.fr

Gestion pâturage

Les épisodes orageux de la semaine dernière ont été peu généreux dans l'ensemble même s'ils ont malgré tout apporté de la fraîcheur par endroit. N'hésitez pas à refaire un tour de vos parcelles de pâturage pour vous rendre compte de la biomasse disponible sur pied. À cette période de l'année et avec les températures annoncées, il va être primordial de consommer uniquement la croissance. Effectivement, la période de pleine pousse est derrière nous, notamment sur les secteurs les plus chauds. Si les consommations sont supérieures aux croissances, la vitalité et la pérennité de vos parcelles vont être entamées et vous risquez de consommer le capital. Malgré le fait que les surfaces d'herbe récoltées les semaines précédentes vont être ajoutées au tour de pâturage, les croissances ne sont pas suffisantes pour mettre les VL dedans rapidement. Il faut laisser suffisamment de temps de repos pour obtenir les 12 cms herbomètres nécessaires à l'entrée des animaux. C'est donc pour cela que les tours de pâturage vont devoir être allongés à 30-35 jours entre 2 passages. Ce temps de repos est nécessaire si vous voulez prolonger votre saison de pâturage de quelques semaines en attendant le retour de la pluie. Pour cela, il faut profiter des reports de stocks de la saison passée pour augmenter la part de ration distribuée à l'auge. Dans les élevages où les animaux pâturent jour et nuit, il va être judicieux de refermer les animaux la nuit afin de réduire les consommations en pâture et ainsi allonger les temps de repos. En moyenne sur le département, nous sommes à 45 kg de MS/ha de pousse. Avec 50% de ration à l'auge, nous pouvons nourrir 6 VL par hectare.



Repère à la botte	à la semelle	entre semelle et talon	au talon	entre talon et cheville	à la cheville	mi-botte
Hauteur de l'herbomètre	2 cm	3 cm	5 cm	8 cm	10 cm	13 cm

Servez-vous des différentes mesures sur le département relevées ci-contre additionnées au tour de parcellaire pour avoir vos repères sur votre exploitation.

