

Etat des lieux de la semaine passée

La pluie tombée ces derniers jours (entre 5 et 50 mm dans le département), ne sera pas suffisante pour recharger les nappes phréatiques. Toutefois, elle va permettre un démarrage de la végétation des prairies et une absorption des minéraux du sol par les racines des plantes. Après les températures douces observées la semaine passée, les quelques jours de froid attendus vont retarder la première pousse de l'herbe de l'année.

La mise à l'herbe se rapproche ... doucement

L'herbe démarre lentement sa pousse. Les croissances mesurées sont encore très faibles. Pour le moment, aucune précipitation à avoir pour sortir ses animaux... Les cumuls de températures observés depuis le 1er février sont encore peu élevés et la première valeur de référence de 250°C pour la mise à l'herbe en parcelles de fauche précoce est atteinte seulement dans le sud du département.

Commune	T°C 0-18° 01/02	Précipitations 01/02	Hauteur / Croissance
Larajasse	155°C	35,5 mm	
Meys	172°C	31 mm	
Beauvallon	247°C	35,5 mm	9,5 cm
Bibost	214°C	31,5 mm	4,5 cm 7 kg croissance
Les Ardillats	181°C	46,5 mm	5,5 cm
Thizy-les-Bourgs	181°C	46,5 mm	

La valeur de référence de 300°C, indiquant la mise à l'herbe dans les prairies destinées au pâturage en première intention, ainsi que la fin du déprimage des parcelles à récolte précoce, ne devrait pas être atteinte avant la fin de la semaine. Il vous donc reste quelques jours pour préparer votre saison de pâturage.

Cette semaine sera consacrée à terminer le pâturage des parcelles de fauche précoce et à réaliser le déprimage des parcelles de foin.

Attention cependant à bien surveiller l'arrivée du redoux qui sera annonciateur d'un démarrage rapide de la pousse de l'herbe. En effet, la forte minéralisation de l'automne, couplée aux précipitations tombées ces derniers jours vont rendre rapidement disponible aux plantes les minéraux du sol et des engrais épandus ces derniers jours

Quelques indicateurs pour gérer ce moment clé

Les températures de référence indiquent que la mise à l'herbe se rapproche. Elles ne doivent cependant pas être le seul indicateur déclenchant le démarrage de la saison de pâturage.

Avant de lâcher vos animaux, il est conseillé de réaliser un tour de vos parcelles en les traversant à pied afin de définir l'ordre de votre premier tour de pâturage.


Voici quelques repères pour optimiser ce premier tour ...

Définir sa durée (temps de retour) : à partir du repère de 300°C, si une majorité des parcelles est à fort potentiel de pousse ou à démarrage précoce, un temps de retour à 25/30 jours sera suffisant. Un parcellaire moins fertile ou moins précoce nécessitera un temps de retour plus long, entre 35 et 40 jours. Si une mise à l'herbe plus précoce à été possible grâce au déprimage de prairies de fauche ou de stocks sur pied restant de l'automne, le premier tour sera plus long, entre 40 et 80 jours. Ce premier tour devra se terminer vers 450°C



Repère 5 cms herbomètre

Observer pour des fourrages de qualité



Respecter un temps de retour long pour ce premier tour de pâturage est primordial pour assurer le rendement de vos prairies. Cette pratique permettra de créer du stock sur pied en ne laissant consommer à vos animaux, sur cette période, que 50% de la croissance. Également, le surpâturage sera évité en donnant la possibilité à l'herbe de reconstituer ses réserves avant le deuxième tour

Définir l'ordre de passage dans les parcelles : le pâturage débutera par les parcelles les plus précoces et les plus portantes, ou bien encore par les parcelles avec un stock important de biomasse de l'automne. Les parcelles moins précoces ou moins portantes seront pâturées dans un second temps

Hauteur d'entrée : Il est possible de déclencher la mise à l'herbe dans les premières parcelles de pâturage dès 5 à 6 cm de hauteur d'herbe (hauteur herbomètre). L'entrée dans les parcelles suivantes sera optimum entre 10 et 12 cm

Temps de pâturage journalier : Il sera défini pour que votre premier tour soit assez long. Si vous avez défini, par exemple, que ce premier tour dure 30 jours, alors peut-être que la surface disponible ne vous permettra de lâcher vos animaux que quelques heures par jour

Et pour sortir mes animaux... quelle hauteur d'herbe rechercher ?

Au démarrage du printemps, l'herbe peut accepter un pâturage ras car elle dispose de l'énergie nécessaire pour reconstituer rapidement ses réserves. Afin de ne pas se faire dépasser par l'herbe, au mois de mars vous pouvez rechercher une hauteur de sortie assez basse, vers 3 cm.

