



Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE

Note Patur'RA

Note N°6 – semaine 11 – lundi 15 mars 2021



La Chapelle de Mardore - 602 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 272°C
Croissance moyenne : 2.3 kg MS/ha/J

Amplepuis - 602 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 326°C

St Laurent de Chamousset - 538 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 286°C

St Martin en Haut - 682 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 260°C

Monsois - 570 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 272°C

Bibost - 420 M


Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 318°C
Croissance moyenne : 14.9 kg MS/ha/J
Mise à l'herbe depuis le 26/02. Pâturage de 12h-17h

Beauvallon - 340 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 313°C
Croissance moyenne : 13.1 kg MS/ha/J

Condrieu - 303 M

Cumul T°C base 0-18 au 01/02 : 343°C



Le rafraîchissement des températures voir l'apparition de neige sur les hauteurs du département ne vont pas être favorables à la pousse de l'herbe ces prochains jours.

Malgré tout, sur les secteurs les plus précoces (>300°C de cumul T°C) la mise à l'herbe doit être effective. Il est donc primordial de sortir les vaches quelques heures par jour en veillant à respecter un temps de repos supérieur à 20-25 jours pour ne pas se laisser entraîner sur une rotation trop rapide du parcellaire. Sur les secteurs les plus tardifs, au vu des températures et des conditions annoncées, la mise à l'herbe peut attendre quelques jours. Il est important de continuer à suivre ses parcelles pour avoir une vue d'ensemble des hauteurs d'herbe.

Mise en place des prairies : anticiper ses achats de semences fourragères pour choisir les espèces et les variétés plutôt que de les subir. Lorsque l'on sème une prairie, il convient de réfléchir à la stratégie que l'on va mettre en place sur la parcelle concernée : durée d'implantation, destination principale, potentiel du sol ... Aujourd'hui, des mélanges « tout fait » existent mais il faut vérifier la compatibilité des espèces avec vos objectifs. Pour faciliter la gestion, un RGA dans une parcelle de pâturage doit être le moins remontant possible. Retrouver toutes les caractéristiques des variétés inscrites au catalogue français sur le site : <http://www.herbe-book.org/>. Bien choisir ses semences ne suffit pas à avoir une belle prairie. Il est impératif de prendre du soin à l'implantation. Sur un semis de printemps, seules les espèces alternatives vont réaliser un monté à l'épi la 1^{ère} année (c'est le cas des RGI alternatifs). Pour les autres, la production sera uniquement feuillue. Pour le mode d'implantation, on a le choix entre le semis classique sous couvert ou non d'une céréale de printemps. L'objectif est d'assurer une levée homogène et rapide. Pour cela, la préparation du lit de semence doit être relativement fine, avec des mottes < à 0,5 cm. Il faut veiller à semer peu profond, à environ 1 cm. Au-delà de 2 cms, le taux de levée diminue fortement. Après le semis, il est important de rappuyer la terre avec un cultipacker. La céréale se sème dans un 1^{er} temps à 50-80kg/ha et la prairie dans un 2^{ème} temps. Vous pouvez aussi choisir de semer votre prairie dans une céréale d'automne déjà implantée. Cette technique favorise les légumineuses, veillez à avoir suffisamment de graminées pour garantir le rendement. Il faut pour cela que la céréale ne soit pas trop forte et surtout pas désherbée. Selon votre secteur, il est peut-être déjà trop tard.

Espèces	Sol	Sain et profond			Alternance hydrique			Hydromorphe			Séchant acide			Séchant calcaire		
		Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage
Espèces majeures	RGH *	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RGA précoce à 1/2 tardif	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RGA tardif à très tardif	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Dactyle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fétuque élevée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fétuque des prés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fléole	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espèces mineures avec intérêt fourrager	Trèfle blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Trèfle violet *	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espèces mineures avec moins d'intérêt fourrager	Luzeerne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sainfoin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lotier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espèces mineures avec moins d'intérêt fourrager	Trèfle hybride	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pâturin des prés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espèces mineures avec moins d'intérêt fourrager	Fétuque rouge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Minette	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Adaptation espèces selon type de sol

Laurine DESMARIS
Port : 06 84 11 43 60
Mail : ldesmaris@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS
Rhône Conseil Elevage - 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

