


Etat des lieux des Ray-Grass

Cela fait maintenant entre 2 et 3 semaines que les passages de fumure minérale ont été faits. Seulement une petite dizaine de millimètre d'eau est tombée en plusieurs fois depuis. Le doute quand à la disponibilité de l'azote dans la solution du sol se pose ... C'est avec optimisme que nous espérons que l'eau annoncée cette semaine va arriver ! Si malheureusement tel n'est pas le cas, pour ceux qui sont équipés et qui ont la possibilité, il faudra dans ce cas-là réfléchir à l'intérêt de l'irrigation sur les parcelles concernées. 15/20 mm d'eau irriguée permettront de rendre l'azote disponible aux racines des prairies implantées.



Commune	T°C 0-18° 01/02	Croissances (Moy. 15 jrs)
Amplepuis	397°C	
Aveize	323°C	16,3 kgs MS
Bessenay	410°C	18 kgs MS
La Chapelle de Mardore	363°C	8,8 kgs MS
Longes	448°C	54,2 kgs MS (34 kgs MS)
Monsols	363°C	6,7 kgs MS
Meys	323°C	19,8 kgs MS
St Martin en Haut	323°C	

Contact: Laurine DESMARIS Port : 06 84 11 43 60 Mail : ldesmaris@cmre.fr

Repères sommes de température

Cette semaine, nous allons atteindre les 400°C de cumul température de moyenne sur le département. Les 400/450°C sont un seuil concernant le repère de la fin de la période de déprimage pour les parcelles qui seront par la suite destinées à la récolte de foin.

Explication : à partir de ce stade, il est important de surveiller l'évolution de l'épi dans la gaine. Aux 450°C de cumul température, il doit être autour des 5 cms. Cela signifie donc que si le pâturage est pratiqué trop ras, l'épi va être consommé par les animaux. De ce fait, la repousse sera uniquement feuillue et donc le rendement diminué.

Pour vous situer, n'hésitez pas à observer les environs proches de vos parcelles. Effectivement, sur les secteurs précoces et dans des parcelles bien exposées, nous observons déjà des espèces qui arrivent au stade épiaison.

Comment s'est passée la mise à l'herbe ?

- *Témoignage de MR DARGERÉ Emmanuel, éleveur sur la commune de BIBOST :*

« J'ai lâché les vaches il y a maintenant un peu moins d'un mois, tout début mars. Ce sont plusieurs éléments déclencheurs qui m'ont fait prendre cette décision. Le beau temps a conduit à une bonne portance des sols, les animaux étaient bien dans les prés avec la météo clémente et l'ensilage d'herbe de l'an passé n'est pas forcément propice à une bonne production de lait. Malgré tout, avec l'eau qui se fait attendre, la croissance ralentie déjà alors que je n'ai pas terminé mon 1^{er} tour de pâturage. Pour ne pas continuer sur cette lancée et ainsi pénaliser la croissance de l'herbe pour la saison, 2 solutions s'offrent à moi :

- ✓ Ajouter des parcelles de fauche accessibles pour augmenter le nombre d'hectares disponibles (possibilité de 4ha en plus)
- ✓ Cloisonner les animaux sur une parcelle autour du bâtiment (parcelle parking) avec une ration distribuée à l'auge afin d'augmenter le temps de repos des paddocks pour qu'ils reprennent de la vigueur de pousse.