

La Chapelle de Mardore 650M


Cumul température 01/02 : 490°C
Croissance hebdomadaire : 10kg/j/ha (9kg sur 15j)
Pâturage ddes parcelles d'ensilage

Meys-600 M

Cumul température 01/02 : 599°C
Croissance hebdomadaire : 18kg/j/ha (21kg sur 15j)
Pâturage des prairies destiné à l'ensilage

Grammond-800 M

Cumul température 01/02 : 554°C



Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 644°C
Croissance hebdomadaire : 37kg (27kg sur 15j)
Augmentation de la surface pâturée

Larajasse 700 M

Cumul température 01/02 : 554°C
Croissance hebdomadaire : 34kg (18kg sur 15j)
Maintient de la ration à l'auge

St Jean de touslas -250 M

Cumul température 01/02 : 700°C
Croissance hebdomadaire : 14kg/j/ha (14kg sur 15j)
agrandissement du parcellaire

Après le froid, le sec pénalise fortement la croissance de ces dernières semaines. Sur le département c'est moins de 5mm qui sont tombés sur les 30 derniers jours.

La croissance est toujours faible pour la saison, le manque de pluie cumulée à un vent quasi quotidien et des températures de fin de printemps amplifient le déficit. Suivant la réserve utile des parcelles, des écarts conséquents de croissance peuvent être observés. Le tour de parcelles hebdomadaire est impératif pour juger de cette différence. C'est la hauteur d'herbe dans les parcelles qui doit définir le rythme de pâturage et le niveau de complémentation à l'auge. La pluie semble enfin annoncée cette fin de semaine, et devrait relancer la croissance mais aussi accélérer l'arrivée des épis. Pour les jours qui viennent, la complémentation à l'auge doit être maintenue de façon à ne pas sortir des parcelles en dessous de 4cm. Il faudra être en revanche réactif dès que la croissance reprendra. Si la pluie est suffisante, les temps de repos devront approcher les 20j pour éviter une monter à l'épis dans toutes les parcelles. Suivant les secteurs, les prairies multi espèces ont passé le stade 5cm. La vérification, sur les graminées principales, de ce stade permet de vérifier si l'on peut encore faire pâturer ces parcelles d'ensilage sans risque de perte importante de rendement.

Suivant le niveau de complémentation à l'auge, la part de tourteau dans la ration doit être ajuster. On retiendra que pour 1kg de MS maïs, il faut entre 100g et 120g de tourteau de soja. Votre taux d'urée est un indicateur vous permettant d'ajuster le niveau MAT de la ration. Dans le contexte difficile pour la filière, il faut toujours avoir en tête, qu'il est important de maximiser la marge/1000l plutôt que d'optimiser à tout prix la production par vache. Si pour une partie des rations, une complémentation en tourteau est indispensable, on visera un taux d'urée maximal de 300mg/l.

Ensilages : le temps sec est favorable à la bonne réalisation des chantiers d'ensilage. Les rendements sont en revanche assez faibles. Le choix de récolter est toujours un compromis quantité vs qualité en cohérence avec votre bilan fourrager annuel et vos objectifs de productions. Suivant le type de prairie (rgi, pme, luzerne), le stade des graminées et la réserve hydrique du sol, l'évolution du rendement est variable d'une parcelle à l'autre et d'un secteur à l'autre. La prise de décision de récolter ou non, dépend de ces différents paramètres et doit rester en cohérence avec vos objectifs. Si vous avez la possibilité d'irriguer vos prairies, cette option doit être envisagée pour optimiser le potentiel des parcelles. Sur les parcelles qui peinent à redémarrer (notamment les RGI) suites aux épisodes de froid, la coupe peut stimuler le redémarrage.

Retrouvez nos vidéos en ligne pour vous accompagner sur la gestion du pâturage

<https://www.facebook.com/Service-Promotion-de-L'Elevage-Laitier-418403301919939/>
<http://www.fidocl.fr/etiquettes/rhone>

