



Commune	T°C 0-18° 01/02	Croissance
Amplepuis	405 °C	
Aveize	321 °C	9,5 kg MS/ha/J
Beauvallon	403 °C	22 kg MS/ha/J
Bibost	410 °C	32 kg MS/ha/J
La Chapelle de Mardore	340 °C	14,4 kg MS/ha/J
La Chapelle Sur Coise	325 °C	22,5 kg MS/ha/J
Meys	325 °C	19 kg MS/ha/J
St Laurent de Chamousset	356 °C	
St Martin en Haut	321 °C	

Repères sommes de températures : que faire ?

- ❑ **Sur les secteurs les plus précoces**, les 400°C de cumuls températures sont atteints. Ce seuil signifie la fin des déprimages sur les parcelles de foin cette semaine. Au-delà de ce stade, le fait de continuer à faire pâturer les animaux va fortement pénaliser le rendement sur vos récoltes de foin.
- ❑ **Sur les secteurs intermédiaires et tardifs**, aux alentours de 350°C de cumuls température, si la mise à l'herbe n'est pas faite, elle devra être envisagée très rapidement pour ne pas consommer de l'herbe trop avancée en stade. Pour faciliter la gestion du pâturage, il faut continuer à faire le tour de vos parcelles pour juger du stock d'herbe sur pied et organiser le tour de parcelles. En fonction de votre jugement en disponibilité d'herbe pour les VL, il faut ajuster les quantités de ration à l'auge pour que les VL pâturent correctement et sans trier sinon elles vont créer des zones de refus dès la 1ère exploitation.

Contact: Laurine DESMARIS Port : 06 84 11 43 60 Mail : ldesmaris@cmre.fr

Tour de fermes : le pâturage, où en sont-ils ?

Aveize : la mise à l'herbe n'est pas encore réalisée.

Beauvallon : les VL ont terminé le 1^{er} tour de pâturage. Conservation de 50% de ration à l'auge. Ajout d'un hectare prévu au départ en ensilage pour allonger le temps de repos. Cette parcelle sera conservée en pâturage.

Bibost : conservation de 5 kg MS ensilage herbe, 1,5 kg de foin et 2 kg de céréales à l'auge pour 18L de lait. Le déprimage des parcelles de foin est terminé.

La Chapelle de Mardore : mise à l'herbe faite depuis 1 semaine. Pâturage les après-midis. 50% de consommation fourrages à l'auge avec 2 kg de céréales pour 24L de lait produits.

Meys : jusqu'à aujourd'hui les VL avait seulement 4 kg MS d'enrubannage à l'auge et 2 kg de céréales de moyenne pour 22L de lait. Vu le temps annoncé les prochains jours, ouverture du silo de maïs pour augmenter la part de ration à l'auge et laisser quelques jours de plus sur la rotation des parcelles de pâturage.

Et les génisses ?

La mise à l'herbe est moins urgente pour elles car elles n'ont pas les mêmes besoins alimentaires. Il faut donc privilégier le temps de préparation des parcs pour ceux des laitières.

