



Observer pour des fourrages de qualité ELEVEUR DE FOURRAGE

Note N°16 – semaine 24 – Lundi 13 juin 2016

La Chapelle de Mardore 650 M


Cumul température 01/02 : 852°c
Crois moy 57 kg/ha/(57 kg/ha sur 15j)

Villechenève-670 M

Cumul température 01/02 : 1061°c
Crois moy : 44 kg/j/ha(50 kg/ha sur 15 j)

Duerne-860 M

Cumul température 01/02 : 923°c
Crois moy : 35kg/j/ha(48kg/ha sur 15j)



Bibost- 400 M1220

Cumul température 01/02 : 1199° c
Crois moy 31 kg/ha/j(40kg/ha sur 15j)

St catherine 800 M exploitation bio

Cumul température 01/02 : 923°
Crois moy : 58kg/j/ha (45kg/ha sur15j)

Soucieu en jarrest -350 M

Cumul température 01/02 : 1220°c
Crois moy : 60 kg (50 kg/ha sur 15j)

Désherbage post levée des maïs

La stratégie prélevée devrait bien fonctionner cette année compte tenu des précipitations régulières depuis les semis des maïs. Néanmoins rappelons que cette stratégie est surtout adaptée pour contrôler les graminées. Elle est généralement insuffisante pour le contrôle des dicotylédones difficiles type renouées liserons ou mercuriales, même en très bonne condition.

Le temps du mois de mai n'a pas favorisé le développement des maïs. Quelques premières applications de post levée ont été réalisées fin de semaine dernière pour les maïs semés fin avril-début mai ou pour des maïs semés vers le 15 mai qui seront binés fin juin. Pour les autres parcelles les applications auront lieu, si la météo le permet, dans les jours qui viennent. Le coût du désherbage est alors d'environ 50-60 €/ha et permet en un seul passage de gérer l'ensemble des adventices. Les doses par hectare sont fonctions du développement des adventices.

La stratégie consiste généralement à associer une tricétone et du nicosulfuron à 50-70% de la dose homologuée (Elumis, Choriste, Souverain OD, Ducanti, Callisto + nicosulfuron, etc ...) avec :

- un prosulfuron (Peak) ou un bromoxynil (Cadeli, Emblem Flo...) à 25-40% de la dose homologuée sans liseron des haies ou des champs, OU
- Casper (prosulfuron + dicamba) à 30-50% de la dose homologuée en présence de liseron des haies ou des champs.

Le choix peut également se porter vers Auxo + Actirob B + nicosulfuron à 50-65% de la dose homologuée.

En post levée, il est essentiel de traiter le matin avant 9h quand l'hygrométrie est la plus élevée et le vent le plus faible.

Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaëlcoquard@cmre.fr

Eric FARRE

Port : 06 75 09 23 99

Mail : eric.farre@rhone.chambagri.fr

