

Météo : fort retard en somme de température suite au gel

<i>Somme de température au 25 février base 0°C depuis le 1er février</i>	<i>2012</i>	<i>2011 (rappel)</i>
<i>Saint Etienne St Geoirs</i>	<i>27</i>	<i>112</i>
<i>Chatte</i>	<i>40</i>	<i>128</i>
<i>Bourgoin</i>	<i>32</i>	<i>132</i>

Les températures douces de la semaine passée devraient rattraper en partie ce retard.

Les perturbations sont à venir et seront les bienvenus (seulement 4 à 6 mm de précipitation en février).

Culture : situation préoccupante

1. Ray grass : *l'état de la culture varie en fonction de son développement avant le gel et de l'enneigement et de l'exposition de la parcelle. Pour les parcelles très avancées (non récoltées à l'automne), le couvert dépassant les 5 cm est détruit par le gel et plaqué au sol. Toutefois, l'ensemble des talles sont épargnées et devraient repartir de la base. Pour ces Ray Grass, la reprise de végétation peut être pénalisée par le manque de lumière et « l'étouffement » provoqué par ce couvert. Il convient de :*

- *Bien vérifier que le couvert n'est pas gelé à la base des talles,*
- *D'envisager pour les situations critiques, un passage léger de herse peigne ou de herse de prairie pour « ouvrir » le couvert et pour laisser passer la lumière,*
- *D'éviter le passage de broyeur ou faucheuse au risque de retrouver cette marchandise dans votre ensilage.*
- *D'éviter les passages trop agressifs de herse risquant de détruire quelques plants et d'amener de la terre dans le couvert.*

2. Luzerne : *Un passage de broyeur peut être envisagé pour les parcelles non fauchées avant le gel. Pour les autres parcelles récoltées tardivement, bien vérifier la reprise de végétation.*

3. Méteil : *hormis quelques feuilles détruites, le pois fourrager, la vesce et le triticales ont semble-t-il bien résisté au gel. On note plus de dégâts sur l'orge et l'avoine mais la base des talles restent vertes.*

4. Prairie : *les prairies naturelles ont fortement souffert. Quelques recommandations sont à prendre pour favoriser la reprise :*

- *Éviter des mises à l'herbe trop précoces,*
- *Éviter actuellement les passages agressifs d'herse,*
- *Un passage de broyeur sur des touffes d'herbes sèches peut être envisagé pour favoriser les repousses.*