



A retenir cette semaine :

Les précipitations ont été très hétérogènes allant de 2 à 30 mm ! Avec 27 kg de croissance de moyenne la semaine dernière, nous sommes en dessous de la normale 2011-2022 qui est à 40 kg.



Sommes de température :

Mise à l'herbe : entre 250°C et 300 °C base 1/02

Semis prairies : 350 °C base 1^{er} février

Fin du 1^{er} tour : 500 °C = stade épi 5 cm

Ensilage précoce : 650 à 700 °C = épi 10 cm

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	6,4	22,7	2ème lot : 31/03
Violay, 700m	6,6	19,9	VL depuis 12/02
Violay, 710m	6,6	23,7	VL le 6/03
Violay, 850m	6,3	32,7	VL le 21/03
St Héand, 700m	6,9	20,3	VL : 6 mars
Nandax, 350 m	-	-	VL Fin février
Chirassimont, 600 m	7,5	21,5	VL 21/03
Lay, 450 m	5,3	35	VL : 20/02
St Bonnet le Courreau, 900m	5,6	24,5	Sortie à venir
St Christo en Jarez, 800m	7,7	41	VL : 30/03



Du côté de la technique : les apports organiques

Les apports organiques, notamment lisier, sont de très bons fertilisants pour assurer les besoins annuels de nos prairies ! Ils doivent néanmoins être apportés suffisamment tôt (surtout pour la pâture) afin d'être diffusés au sol et que les feuilles des plantes soient nettoyées (6-8 semaines avant). Les apports sur prairies installées sont donc plus appropriés et efficaces en novembre et décembre sur les pâtures (tout en respectant la réglementation)



Erreur à éviter : apport de lisier le 29 mars sur pâture destinée au vaches laitières

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mars
Bard	360	86
Noirétable	394	157,4
St Sauveur en Rue	387	84,5
Violay	376	58,2



Montagne (> 800m)

Les mises à l'herbe se font tranquillement afin de commencer à valoriser les parcelles poussantes bien exposées et réaliser une transition alimentaire. La sortie des animaux en début d'après-midi permet de contrer les températures froides annoncées.

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mars
Chazelles sur Lyon	420	52,5
Fourneaux	452	51,9
La Valla en Gier	441	88,3
Panissières	443	44,3
St Georges en Couzan	418	87,4



Coteaux (600-800m)

Il reste une dizaine de jours pour finir le premier tour. Des parcelles de prairies temporaires prévues pour la fauche peuvent encore être pâturées pour compenser le manque de pousse de l'herbe ! Elles seront récoltées plus tard dans le printemps



Plaine (400-600mm)

Le premier tour doit se finir ; les parcelles destinées à la fauche (ensilage tardif ou foin) seront fermées ! Le complément fourrage distribué à l'intérieur si besoin va se réduire au profit de l'herbe au champ

Source infoclimat / météo France au 01/04/2023



« Jamais pluie de printemps n'a passé pour mauvais temps »

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
 Loire Agglo Paysan



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
Contact : Stéphane LAURENT
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>
Contact : Pierre VERGIAT
 Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
 Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez