



A retenir cette semaine :

La pousse de l'herbe a de nouveau fléchi en croissance à 36 Kg MS/ha/jour de moyenne sur le département la semaine dernière, soit 13 kg de moins que la moyenne 2011-2022.



Sommes de température :

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C

Pleine épiaison : 1 000 °C foin précoce

Pleine floraison : 1 200 °C période de foin optimale



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	8	37	Fauche des refus en sortie de parcelle
Violay, 700m	8,2	42	3 ^{ème} tour + lot suiveur pour refus
Violay, 710m	8,4	28	3 ^{ème} tour, gestion avec fauche refus
Violay, 850m	-	-	Sortie toutes PN pour fauche
St Héand, 700m	11,5	33	Pâturage jour et nuit
Chirassimont, 600 m	-	-	Pâturage jour et nuit + 1/3 ration
Nandax	7,9	39	Pâturage repousses
Lay, 450 m	-	-	Pâturage jour et nuit
St Bonnet le Courreau, 900m	-	-	Pâturage jour + 1/3 ration
St Christo en Jarez, 800m	6,9	34	Pâturage jour et nuit + foin



Du côté de la technique : Broyage des refus

Quelques petits rappels : une hauteur de fauche de 7 cm afin de faciliter la repousse !

Cette pratique doit être le dernier recours de gestion des refus ! En effet, la repousse est beaucoup plus lente et l'appétence des repousses peut être fortement pénalisée en cas de résidus important qui vont moisir et rester en surface des nouvelles pousses. Un passage de taries ou génisses ou encore bœufs laitiers est préférable pour consommer une partie de l'herbe résiduelle.



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Bard	1013	51,8
Noirétable	1050	97,4
St Sauveur en Rue	1054	112,3
Violay	1048	65

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Chazelles sur Lyon	1137	71,1
Fourneaux	1190	58,8
La Valla en Gier	1178	129,8
Panissières	1164	49,6
St Georges en Couzan	1114	57

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Arthun	1186	42,4
Balbigny	1246	49,7
Nandax	1232	62,2
Pélussin	1329	70,4
Savigneux	1204	45,9
Veauchette	1220	60,8



Montagne (> 800m)

Avec 100 °C de cumulés la semaine dernière, la végétation évolue ; les foins précoces vont pouvoir se réaliser, permettant ainsi de rajouter des parcelles dans le circuit de pâturage à partir du 15 juin



Coteaux (600-800m)

Les premières coupes de foin traditionnel vont pouvoir se réaliser cette semaine ; en même temps que la récolte des deuxièmes coupes en ensilage



Plaine (400-600mm)

Sur des prairies à base de ray-grass et dactyle, les repousses sont à exploiter en pâturage à partir de 15-18 jours après la dernière récolte, afin de valoriser l'herbe jeune et limiter la remontée à épiaison

Source infoclimat / météo France au 03/06/2023



Bœufs à l'herbe valorisant les mauvaises pâtures et les refus des laitières



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez