



A retenir cette semaine :

Finir la préparation des parcelles, accès et abreuvement. La fertilisation va pouvoir redémarrer avec la hausse des températures annoncée et le retour des précipitations.



Sommes de température :

Lisier : 8 semaines avant exploitation

Fumier : 3 mois avant exploitation

Apport minéral : si besoin entre 200 °C en base 1^{er} janvier et 200 °C en base 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250°C et 300 °C



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	6		
Violay, 700m	6,8		VL depuis 12/02
Violay, 710m	6,2		
Violay, 850m	5,2		
St Héand, 700m			
St Christo en Jarez, 800m	5,5	10	Sortie génisses



Du côté de la technique : l'apport minéral sur pâture

Ne pas retarder la sortie des animaux à cause de l'apport minéral : un premier tour de pâture peut être fait avant afin de consommer l'herbe résiduelle de l'hiver et favoriser la reprise de végétation !

L'apport minéral (si nécessaire) sera réalisé après ce premier tour des animaux. Cela permet aussi de faire une transition alimentaire en sortant les animaux 3-4 h par jour (les après-midi si gelées matinales)

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Février
Bard	141	6
Noirétable	163	9,8
St Sauveur en Rue	144	12,5
Violay	153	9,4

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Février
Chazelles sur Lyon	169	6,2
Fourneaux	186	4,4
La Valla en Gier	174	8,8
Panissières	185	3,6
St Georges en Couzan	175	5,4

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Février
Arthun	186	5,8
Balbigny	201	5,2
Nandax	200	3,2
Pélussin	210	10
Savigneux	190	6,6
Veauchette	183	3,6



Montagne (> 800m)

10 °C cumulés cette semaine ; la végétation ne bouge pas

Les températures annoncées en fin de semaine vont permettre de faire débuter le printemps



Coteaux (600-800m)

Nous sommes dans la plage des apports minéraux 200°C base 1^{er} janvier et 200°C base 1^{er} février.

Les animaux peuvent sortir sur les prairies pour valoriser la pousse hivernale, voir utiliser les nouvelles prairies autour des bâtiments (bonne portance)



Plaine (400-600mm)

Le premier tour de pâturage précoce permet de faire consommer de l'herbe résiduelle ayant poussé durant l'hiver.

Les 250°C base 01/02 sont attendus autour du 15 mars. Pour rappel, ils ont été obtenus le 13/03/2022.

Source infoclimat / météo France au 25/02/2023



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez