



## ***A retenir cette semaine :***

La pluie qui était très attendue est enfin arrivée. Elle sera très bénéfique pour la sécheresse de surface mais toujours insuffisante pour la recharge des nappes.

La pousse de l'herbe devrait s'accélérer avec des températures proches des « normales » saisonnières.



## ***Sommes de température :***

Lisier : 8 semaines avant exploitation

Fumier : 3 mois avant exploitation

Apport minéral : si besoin entre 200 °C en base 1<sup>er</sup> janvier et 200 °C en base 1<sup>er</sup> février

Mise à l'herbe : entre 250°C et 300 °C base 1<sup>er</sup> février



## ***Réseau suivi croissance d'herbe :***

| Localisation                | Hauteur (cm) | Kg MS/ha/Jour | Mise à l'herbe              |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| St Marcel de Félines, 490m  | 5,7          | 1,7           | 1 <sup>er</sup> lot : 25/02 |
| Violay, 700m                | 6            | 11,5          | VL depuis 12/02             |
| Violay, 710m                | 6,6          | 6,5           | VL le 6/03                  |
| Violay, 850m                | 5,8          | 12,4          | -                           |
| St Héand, 700m              | -            | -             | -                           |
| Chirassimont, 600 m         | 6            | -             | -                           |
| St Bonnet le Courreau, 900m | -            | -             | -                           |
| St Christo en Jarez, 800m   | 5,6          | 14            | Sortie génisses             |



## ***Du côté de la technique : le déprimage***

Les premières fleurs des forsythias sont sorties. Les premiers animaux peuvent débiter le déprimage en zone de plaine si les conditions de portances sont réunies. Le talon de la botte ne doit pas s'enfoncer à plus de 4 cm de profondeur.

Avant d'envisager les premières sorties d'animaux, il convient de vérifier la quantité d'herbe dans les paddocks. Une hauteur moyenne de 6 cm, au-dessous du talon de la botte, est requise pour le début du déprimage.

| Stations météo    | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mars |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| Bard              | 177                    | 44,6               |
| Noirétable        | 205                    | 83,1               |
| St Sauveur en Rue | 185                    | 34,3               |
| Violay            | 188                    | 22,8               |

| Stations météo       | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mars |
|----------------------|------------------------|--------------------|
| Chazelles sur Lyon   | 212                    | 20,6               |
| Fourneaux            | 230                    | 17,9               |
| La Valla en Gier     | 223                    | 35,9               |
| Panissières          | 229                    | 16,8               |
| St Georges en Couzan | 220                    | 42                 |

| Stations météo | Somme T°C depuis 01/02 | Cumul pluvio. Mars |
|----------------|------------------------|--------------------|
| Arthun         | 235                    | 25                 |
| Balbigny       | 253                    | 16,6               |
| Nandax         | 246                    | 21,3               |
| Pélussin       | 263                    | 44,1               |
| Savigneux      | 241                    | 27                 |
| Veauchette     | 237                    | 13,2               |



### Montagne (> 800m)

Encore quelques jours possibles pour réaliser les premiers apports pour les fauches précoces et les hersages de prairies. Pour rappel ces derniers doivent être faits uniquement en cas de nécessité, présence de taupe notamment.



### Coteaux (600-800m)

Les premiers apports pour les fauches précoces sont à terminer dès que possible (200°C) ainsi que les hersages de prairies.



### Plaine (400-600mm)

Avec l'atteinte des 250°C les mises à l'herbe vont pouvoir débuter en vérifiant les conditions de portance suite aux dernières pluies. Les croissances d'herbes sont plutôt faibles pour le moment, permettant de faire tourner les animaux rapidement sur le premier tour.

Source infoclimat / météo France au 11/03/2023



Fauche d'un blé trop développé à Violay vendredi dernier



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>  
 Contact : Stéphane LAURENT  
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr  
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>  
 Contact : Pierre VERGIAT  
 Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr  
 Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez