



A retenir cette semaine :

La pousse de l'herbe se maintient en croissance à 41 Kg MS/ha/jour de moyenne sur le département la semaine dernière, soit 10 kg de moins que la moyenne 2011-2022.



Sommes de température :

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C

Pleine épiaison : 1 000 °C foin précoce

Pleine floraison : 1 200 °C période de foin optimale

Floraison terminée : 1 400 °C foin mûr



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	7,7	32	Le 100 % pâturage se termine
Violay, 700m	7,6	26	Pâturage des repousses et nettoyage
Violay, 710m	8,7	34	Fin 4 ^{ème} tour, rajout parcelles ensilées
Violay, 850m	9,1	28	Pâturage PT derrière ensilage
St Héand, 700m	-	-	-
Chirassimont, 600 m	-	-	-
Lay, 450 m	-	-	-
St Bonnet le Courreau, 900m	8,4	51	Pâturage jour + 1/4 ration
St Christo en Jarez, 800m	8,9	77	Pâturage jour et nuit + foin



Du côté de la technique : Privilégiez la qualité

Choix des récoltes : foin de première coupe et ensilage en deuxième coupe

Lorsque les fenêtres météo sont limitées et que les travaux s'accumulent, privilégiez la récolte des fourrages destinés aux animaux plus productifs (vaches laitières, animaux à l'engrais) ayant plus de besoins. Pour cela, il vaut mieux récolter ses deuxièmes coupes avant de finir la récolte des foins qui seront plutôt destinés aux génisses !



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Bard	1231	31,6
Noirétable	1250	54
St Sauveur en Rue	1270	50,9
Violay	1273	23,6

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Chazelles sur Lyon	1362	51,4
Fourneaux	1417	34,4
La Valla en Gier	1400	54,3
Panissières	1388	36
St Georges en Couzan	1317	67,8

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Arthun	1393	23,8
Balbigny	1461	26,2
Nandax	1457	14,2
Pélussin	1565	59,3
Savigneux	1408	41,4
Veauchette	1438	49,8



Montagne (> 800m)

La période optimale entre quantité et qualité de foin est atteinte. En cas de pressage en conditions limite, veillez à vérifier l'évolution des températures au cœur de vos bottes avant de les empiler sous un hangar !



Coteaux (600-800m)

La gestion des refus et salissement est préférable en fauche à plat : en effet, les plantes redémarrent plus vite et les résidus laisser au sol les protègent du soleil et conservent l'humidité



Plaine (400-600mm)

La croissance ralentie avec l'augmentation des températures et l'eau limitante. Attention à ne pas surexploiter les parcelles (pâturage ras ou fauche courte) qui amplifie le réchauffement du sol et la dégradation des prairies

Source infoclimat / météo France au 17/06/2023



Le manque d'eau commence à se voir sur les prairies implantées en sols légers avec peu de réserves



Essai de betterave fourragère à pâturer au fil pour apporter de la fraîcheur cette été



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>

Contact : Fanélie BOYER

fanelie.boyer@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez