




Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°1 - semaine - lundi 12 février 2018

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} janvier Source Météo France 10/2/18



Boën - 430m

Somme de t° : 213° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : **atteinte**
Apports possibles

Charlieu - 279m

Somme de t° : 221° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : **atteinte**
Apports possibles

Bard - 810m

Somme de t° : 158° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 24/2/18

Grammond - 804m

Somme de t° : 166° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 21/2/18

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 210° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : **atteinte**
Apports possibles

Fourrages de qualité : fertiliser au bon moment pour une valorisation optimale de vos engrais.

Après un mois de janvier doux favorable au démarrage de la végétation, la neige a ramené un peu d'eau sur nos sols en déficit hydrique. Les sommes de température sont atteintes pour prévoir les apports de fertilisants organiques et minéraux en plaine. Le sol doit se réessuyer avant que les conditions d'épandage soient optimales. Les apports d'engrais organiques, notamment les lisiers, seront très bien valorisés ces jours. Ils pourront participer à une bonne part des besoins azotés des plantes.

Pour les prairies précoces, conduites en ensilage ou en enrubbage, l'apport d'azote doit être réalisé dans les 15 jours qui précèdent le démarrage de végétation. Cela se traduit entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février. Ainsi, l'apport sera utilisé au cours de la croissance des plantes. Un apport trop tardif pénalise le rendement comme le montre le graphique ci-contre.

Attention : rappel réglementaire

En zone vulnérable, les apports d'engrais minéraux sont interdits jusqu'au 28/2 sur prairies de plus de 6 mois en zone de montagne.

Tous vos repères sur l'outil : **Date N°Prairies** d'Arvalis.

Céréales : croissance sur janvier.

En général, les céréales ont peu poussé l'automne 2017. Sur les parcelles peu denses ou peu tallées, un apport, en même temps que sur les prairies à ensiler est à faire en engrais minéral ou organique si les conditions d'épandage le permettent.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :


Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février

Effet de la DATE d'APPORT sur le rendement



Source Arvalis

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage - Sourcieux - 42600 Chalain Le Comtal

